

【豊橋市】生活習慣病と医療費に関するデータ

・ 目次

- － I . 豊橋市と愛知県の基準値該当割合比較
- － II . 豊橋市 大分類別医療費構成割合
- － III . 特定健診におけるリスク因子の市区町村別比較


※平成26年度における協会けんぽの生活習慣病予防健診受診者(40歳～74歳)データより

※協会けんぽ 平成27年度居住地受診地別医療費基本情報データより

I. 豊橋市と愛知県の基準値該当割合比較


男性

基準値該当割合比較(豊橋市と愛知県)



女性

基準値該当割合比較(豊橋市と愛知県)



男女ともに「血糖値」と「HbA1c」の該当割合が愛知県平均より特に高い。

【平成26年度における協会けんぽの生活習慣病予防健診受診者(40歳～74歳)データより】

分析項目

健診の指標

■ メタボリック該当者

■ 腹囲	≥ 85 (男)/ 90 (女)cm
■ 中性脂肪	≥ 150 mg/dl
■ HDLコレステロール	< 40 mg/dl
■ 血糖値	空腹時血糖 ≥ 100 mg/dl
■ HbA1c	$\geq 5.6\%$
■ 血圧高値	$\geq 130/85$ mmHgまたは服薬
■ LDLコレステロール	< 140 mg/dl
■ 喫煙者	

Ⅱ．豊橋市 大分類別医療費構成割合

【入院医療費】

分類名	構成割合比較			
	豊橋市	順位	愛知県	順位
新生物	22.0%	1	21.5%	1
循環器系の疾患	15.7%	2	15.9%	2
消化器系の疾患	6.8%	3	7.0%	3
筋骨格系及び結合組織の疾患	5.3%	4	5.4%	5
呼吸器系の疾患	4.4%	5	5.5%	4
精神及び行動の障害	4.3%	6	4.1%	6
腎尿路生殖器系の疾患	3.8%	7	3.2%	7
眼及び付属器の疾患	2.5%	8	2.1%	8
内分泌、栄養及び代謝疾患	2.3%	9	2.0%	9
その他	33.0%		33.4%	

【外来医療費】

分類名	構成割合比較			
	豊橋市	順位	愛知県	順位
呼吸器系の疾患	14.3%	1	15.7%	1
循環器系の疾患	12.7%	2	10.5%	2
内分泌、栄養及び代謝疾患	12.0%	3	10.2%	3
筋骨格系及び結合組織の疾患	8.7%	4	7.7%	5
新生物	8.5%	5	9.0%	4
消化器系の疾患	5.8%	6	5.9%	7
腎尿路生殖器系の疾患	5.7%	7	6.6%	6
眼及び付属器の疾患	5.7%	7	5.8%	8
精神及び行動の障害	4.2%	9	3.9%	9
その他	22.3%		24.6%	

【外来(調剤含む)医療費】

分類名	構成割合比較			
	豊橋市	順位	愛知県	順位
呼吸器系の疾患	15.2%	1	16.9%	1
循環器系の疾患	12.8%	2	11.9%	2
内分泌、栄養及び代謝疾患	12.1%	3	11.1%	3
筋骨格系及び結合組織の疾患	8.2%	4	7.2%	5
新生物	7.5%	5	7.5%	4
消化器系の疾患	5.6%	6	5.8%	6
精神及び行動の障害	5.6%	6	5.1%	8
腎尿路生殖器系の疾患	5.1%	8	5.6%	7
眼及び付属器の疾患	4.7%	9	4.6%	9
その他	23.1%		24.3%	

□入院医療費：

新生物(がん)の割合が22.0%と最も高い。次いで循環器系の疾患(高血圧・心疾患・脳血管疾患など)の割合が15.7%と高い。この2分類で全体の38%を占める。

□外来医療費：

呼吸器系の疾患の割合が14.3%と最も高い。次いで循環器系の疾患、内分泌、栄養および代謝疾患が続く。

□外来(調剤含む)医療費：

外来医療費とその傾向は大きく変わらない。

※愛知県より構成割合が高い分類は赤・低い分類は青で表示。
 ※分類名について、代表的な分類のみ掲載し、それ以外はその他に含める。

【協会けんぽデータ 平成27年度居住地受診地別医療費基本情報より】

Ⅲ. 特定健診におけるリスク因子の市区町村別比較

【分析の概要】

- ・平成26年度における協会けんぽの生活習慣病予防健診受診者(40歳～74歳)
- ・健診項目ごとの有所見率を年齢調整した上で市区町村比較をするために標準化該当比を算出し、地図に表す。


【標準化該当比の算出について】

- ・標準化該当比は、性別年齢構成が市町村により異なるのを補正する目的で算出するもの
- ・特定健診の各指標について、市区町村・性・年齢階級(5歳区分)別の「実施人数」と「うち基準に該当する人数」をもとに算出
- ・県(基準集団)での有所見率を100として、標準化該当比が100より大きい場合は有所見率が県より高く、100より小さい場合は有所見率が県より低いことを示す。
- ・今回は、標準化該当比を計算し、「有意に高い」、「高いが有意ではない」、「低いが有意ではない」、「有意に低い」の4段階に区分した。
- ・受診者数または該当者数が10人未満となるデータは削除しているため、欠損値となる。


分析項目	
健診の指標	
■ メタボリック該当者	
■ 腹囲	≥ 85(男)/90(女)cm
■ 空腹時血糖	≥ 100mg/dl
■ 中性脂肪	≥ 150mg/dl
■ 高血圧	≥ 140/90mmHgまたは服薬

【メタボリックシンドローム該当者】

【男性】




【女性】




・男女ともに名古屋市南部・知多半島が有意に高い

【腹囲 ≥ 85 (男)/ 90 (女)cm】

【男性】




【女性】




- ・男性は名古屋市・美浜町・豊橋市が有意に高い
- ・女性は名古屋市・東海市・阿久比町・豊田市が有意に高い

【空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ 】

【男性】




【女性】




- ・男性は弥富市・知多半島北部・南知多町・岡崎市・豊橋市・東栄町が有意に高い
- ・女性は尾張北部・北区・豊明市・岡崎市・幸田町・豊橋市が有意に高い

【中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 】

【男性】




【女性】




- ・男性は中区・昭和区・東区・北区・常滑市が有意に高い
- ・女性は中川区・港区・東海市・豊明市が有意に高い

【高血圧 $\geq 140/90\text{mmHg}$ または服薬】

【男性】



【女性】



- ・男性は尾張・海部・西三河・東栄町が有意に高い
- ・女性は尾張・海部・西三河・南知多町・蒲郡市が有意に高い