

協会けんぽの都道府県支部別医療費等の状況（平成30年度）

1. 都道府県支部別 1 人当たり医療費の状況

- ・ 都道府県支部別加入者 1 人当たり医療費の状況（全国平均との差）（平成30年度）
- ・ 都道府県支部別加入者 1 人当たり医療費（全国平均との差）の前年度差（平成30年度）
- ・ 都道府県支部別地域差指数（入院、入院外（調剤を含む）、歯科、その他）の比較（平成30年度）
- ・ 都道府県支部別地域差指数（入院、入院外（調剤を含む）、歯科、その他）の前年度差（平成30年度）
- ・ 地域差指数の比較（協会けんぽと市町村国保）（平成30年度）

2. 入院医療費の状況

- ・ 都道府県支部別 1 人当たり入院医療費とその三要素（受診率、1 件当たり日数、1 日当たり医療費）
- ・ 入院医療費の内訳（平成30年 4 月～平成31年 3 月）
- ・ 都道府県支部別 1 人当たり入院医療費の主な内訳（平成30年 4 月～平成31年 3 月）
- ・ 加入者 1 人当たり入院医療費と加入者 1 人当たり入院外医療費（平成30年度）
- ・ 加入者 1 人当たり入院医療費と平均在院日数（平成30年度）
- ・ 加入者 1 人当たり入院医療費と人口10万対病床数（平成30年度）

3. 入院外医療費の状況

- ・ 都道府県支部別 1 人当たり入院外医療費とその三要素（受診率、1 件当たり日数、1 日当たり医療費）
- ・ 入院外医療費の内訳（平成30年 4 月～平成31年 3 月）
- ・ 都道府県支部別 1 人当たり入院外医療費の主な内訳（平成30年 4 月～平成31年 3 月）
- ・ 都道府県支部別 1 人当たり入院外医療費（高血圧・脂質異常症・糖尿病）の状況

4. 都道府県支部別健診結果の状況

- ・ メタボリックリスク保有率
- ・ メタボリックリスク予備群の割合
- ・ 腹囲リスク保有率
- ・ 血圧リスク保有率
- ・ 脂質リスク保有率
- ・ 代謝リスク保有率
- ・ 喫煙者の割合
- ・ BMI リスク保有率
- ・ 中性脂肪リスク保有率
- ・ HDL コレステロールリスク保有率


5. 都道府県単位保険料率の状況

- ・ 医療給付費の保険料率に係る地域差の内訳（令和2年度）
- ・ 医療給付費の保険料率に係る地域差の前年度差の内訳（令和2年度）
- ・ 令和2年度所要保険料率に関する年齢・所得調整前後の比較
- ・ 料率の格差（最高料率／最低料率）の推移
- ・ 料率の格差（最高料率／最低料率）の市町村国保との比較

1. 都道府県支部別 1 人当たり医療費の状況


都道府県支部別加入者1人当たり医療費の状況(全国平均との差)(平成30年度)

年齢調整:なし
所得調整:なし




都道府県支部別加入者1人当たり医療費(全国平均との差)の前年度差(平成30年度)

年齢調整:なし
所得調整:なし




都道府県支部別地域差指数(入院、入院外(調剤を含む)、歯科、その他) の比較(平成30年度)

年齢調整:あり
所得調整:なし




都道府県支部別地域差指数(入院、入院外(調剤を含む)、歯科、その他)
の前年度差(平成30年度)

年齢調整:あり
所得調整:なし





地域差指数の比較(協会けんぽと市町村国保) (平成30年度)

年齢調整:あり
所得調整:なし



2. 入院医療費の状況

・都道府県支部別1人当たり入院医療費とその三要素




■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄

(日/件)

1件当たり日数(入院)(全国平均との差)


平均:9.68日/件




(円/日)

1日当たり医療費(入院)(全国平均との差)

平均:52,738円/日



入院医療費の内訳(平成30年4月～平成31年3月)




うち、悪性新生物 19.2%
良性新生物 4.0%

うち、心疾患 8.9%
脳血管疾患 6.8%


都道府県支部別1人当たり入院医療費の主な内訳(平成30年4月～平成31年3月)

(千円)




注. 生活習慣病(がんを除く)は、内分泌・栄養及び代謝疾患(糖尿病、脂質異常症)、循環器系疾患(高血圧性疾患、虚血性心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化(症)、その他の脳血管疾患)に該当するものを分類している。


加入者1人当たり入院医療費と加入者1人当たり入院外医療費（平成30年度）




加入者1人当たり入院医療費と入院受診率(平成30年度)



加入者1人当たり入院医療費と平均在院日数(平成30年度)





加入者1人当たり入院医療費と人口10万対病床数(平成30年度)



3. 入院外医療費の状況


・都道府県支部別1人当たり入院外医療費とその三要素



1件当たり日数(外来)(全国平均との差)

平均: 1.42 日/件


(日/件)



1日当たり医療費(外来(調剤を含む))(全国平均との差)


平均: 11,936 円/日

(円/日)



入院外医療費の内訳(平成30年4月～平成31年3月)


※入院外の医療費には調剤分を含む。



注. 括弧内は平成29年度の数値である。

都道府県支部別1人当たり入院外医療費の主な内訳(平成30年4月～平成31年3月)

(千円)




※入院外の医療費には調剤分を含む。


注. 生活習慣病(がんを除く)は、内分泌、栄養及び代謝疾患(糖尿病、脂質異常症)、循環器系疾患(高血圧性疾患、虚血性心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化(症)、その他の脳血管疾患)に該当するものを分類している。

・高血圧、脂質異常症、糖尿病の1人当たり医療の状況

1人当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))(全国平均との差)




受診率(高血圧、外来)(全国平均との差)




1件当たり日数(高血圧、外来)(全国平均との差)

平均:1.22日/件




1日当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))(全国平均との差)

平均:12,587円/日




■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄

1人当たり医療費(脂質異常症、外来(調剤を含む))(全国平均との差)



受診率(脂質異常症、外来)(全国平均との差)




北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄

1件当たり日数(脂質異常症、外来)(全国平均との差)

平均:1.26日/件


(日/件)



1日当たり医療費(脂質異常症、外来(調剤を含む))(全国平均との差)

平均:12,124円/日

(円/日)




■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄

1人当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))(全国平均との差)

(円/人)


平均:6,353円/人



受診率(糖尿病、外来)(全国平均との差)

(件/千人)


平均:210件/千人



■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄


1件当たり日数(糖尿病、外来)(全国平均との差)

平均:1.26日/件





1日当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))(全国平均との差)

平均:23,916円/日



4. 都道府県支部別健診結果の状況


4. 健診結果の状況



北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄


メタボリックリスク予備群の割合(男)(全国平均との差)

平均:17.8%



メタボリックリスク予備群の割合(女)(全国平均との差)


平均:5.5%



北海道・東北 関東・甲信越 北陸 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄


腹囲リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:48.4%



腹囲リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:14.5%



北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄


血圧リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均: 48.5%



血圧リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均: 30.6%



■ 北海道・東北 ■ 関東・甲信越 ■ 北陸 ■ 東海 ■ 関西 ■ 中国 ■ 四国 ■ 九州・沖縄


脂質リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:35.0%



脂質リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:15.7%



北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄


代謝リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:19.1%



代謝リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:8.2%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄


喫煙者の割合(男)(全国平均との差)

平均:42.2%



喫煙者の割合(女)(全国平均との差)


平均:16.4%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 ■北陸 ■東海 ■関西 ■中国 ■四国 ■九州・沖縄


BMIリスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:35.8%




BMIリスク保有率(女)(全国平均との差)

平均:21.6%




北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄



平均:27.0%



平均:8.7%




☒ 北海道・東北
 ☒ 関東・甲信越
 ☒ 北陸
 ☒ 東海
 ☒ 関西
 ☒ 中国
 ☒ 四国
 ☒ 九州・沖縄



5. 都道府県単位保険料率の状況


医療給付費の保険料率に係る地域差の内訳（令和2年度）

年齢調整：あり
所得調整：あり



医療給付費の保険料率に係る地域差の前年度差の内訳（令和2年度）


年齢調整:あり
所得調整:あり




(%)

令和2年度所要保険料率に関する年齢・所得調整前後の比較


地域差 年齢差 所得差 調整前 調整後



料率の格差(最高料率／最低料率)の推移



料率の格差(最高料率／最低料率)の市町村国保との比較



[参考]

○ 医療費データについて

- ・ 傷病合計の医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績（平成30年4月～平成31年3月）である。
- ・ 傷病別の医療費は、平成30年4月～平成31年3月のレセプト（入院については電子レセプトのみ、入院外については電子レセプト及び電算機で作成されたレセプト（続紙付レセプトを除く））の集計値であり、入院外レセプトと調剤レセプトを接続させている。
- ・ 都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したものである。
- ・ 生活習慣病（がんを除く）は、内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病、脂質異常症）、循環器系疾患（高血圧性疾患、虚血性心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化（症）、その他の脳血管疾患）に該当するものを分類している。

○ 健診データについて

- ・ 集計対象データは平成30年度末に35歳以上75歳以下に達し、1年間継続して協会けんぽに加入した被保険者が平成30年度中に受診した生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）データのうち、特定保健指導レベルが判定不可能でないもの（35～39歳の特定保健指導レベルは40歳以上の階層化の方法に準じて判定）とし、リスク保有者割合等の分母は、特に断りのない場合、当該リスクの判定が可能なデータの総数としている。
 - ① メタボリックリスク保有率は、③かつ④～⑥のうち2項目以上に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）
 - ② メタボリックリスク予備群の割合は、③かつ④～⑥のうち1項目に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）
 - ③ 腹囲のリスク保有率は、内臓脂肪面積が100cm²以上の者（ただし内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者）の割合
 - ④ 血圧のリスク保有率は、収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑤ 脂質のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑥ 代謝のリスク保有率は、空腹時血糖110mg/dl以上（ただし空腹時血糖の検査がない場合は、HbA1c 6.0%以上）、または糖尿病に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑦ 喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者の割合
 - ⑧ BMIのリスク保有率はBMI（肥満度）が25以上の者の割合
 - ⑨ 脂質（中性脂肪）のリスク保有率は中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
 - ⑩ 脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率はHDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合

○ その他

- ・ R-2乗値は、2つのデータがどの程度相関（1つのデータの変化に伴ってもう一方のデータも変化すること）しているかを示す指標。（完全に相関しているときは1となり、全く相関していないときは0となる。）
- ・ データの各数値は速報値である。

