

2021年度 支部別スコアリングレポート

《熊本支部》

支部別スコアリングレポートは支部ごとの健診受診率、特定保健指導実施率に加え、男女別の健診結果や問診結果の年齢調整平均値及び医療費をレーダーチャートやグラフにより見える化した資料です。

棒グラフは直近年度の全支部の数値ですので、他支部との比較を行う際に活用いただけます。また、折れ線グラフは自支部の直近4年間の経年変化について全国比と全国順位をご確認いただけます。そのほかレーダーチャートに加えて順位に基づくABC区分を記載しておりますので、レーダーチャートと合わせて支部の課題を把握する際の参考としてください。

今年度から一部の基準を変更しました（詳細は VI各指標の算出方法を参照してください）


- ・代謝(血糖)リスクの基準
- ・脂質リスクの基準
- ・運動、食事、飲酒習慣要改善者の基準

《目次》

I	健診受診率・特定保健指導実施率の概要	2
	（健診受診率の状況）	3
	（特定保健指導実施率の状況）	5
II	生活習慣病リスク保有者の割合	
	（男性）	8
	（女性）	12
III	生活習慣要改善者の割合	
	（男性）	16
	（女性）	20
IV	医療費の状況	24
V	生活習慣に関する参考データ	25
VI	各指標の算出方法	28

I 健診受診率・特定保健指導実施率の概要

【健診受診率・特定保健指導実施率(2021年度)】



※ 健診受診率・特定保健指導実施率が高い順に1位→47位となっています。

指標1	生活習慣病予防健診受診率	B	指標2	事業者健診データ取得率	B
指標3	健診受診率(被保険者計)	B	指標4	特定健診受診率(被扶養者)	B
指標5	初回面談実施率(被保険者)	A	指標6	実績評価実施率(被保険者)	A
指標7	初回面談実施率(被扶養者)	B	指標8	実績評価実施率(被扶養者)	B


A:順位1位～10位、B:順位11位～37位、C:順位38位～47位

2021年度の健診受診率と特定保健指導実施率の概要は上記のとおりです。それぞれの数値の詳細及び経年変化等については、次ページ以降をご確認ください。


健診受診率の状況

指標1 【生活習慣病予防健診受診率（40～74歳）】

①2021年度の全支部の受診率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部の受診率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)

指標2 【事業者健診データ取得率】

①2021年度の全支部のデータ取得率と全国平均 (%)



②2018年度から2021年度の自支部の受診率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


指標3【被保険者健診受診率（生活習慣病予防健診+事業者健診）】

①2021年度の全支部の受診率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部の受診率と全国順位及び全国平均




	年度	受診者数	受診率 (%)
熊本支部	2018	155,856	63.6
	2019	169,261	67.2
	2020	171,314	67.1
	2021	184,778	70.8
全国平均	2021	-	62.1

(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


指標4【特定健診受診率（被扶養者）】

①2021年度の全支部の受診率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部の受診率と全国順位及び全国平均




	年度	受診者数	受診率 (%)
熊本支部	2018	15,792	24.8
	2019	14,947	23.4
	2020	13,586	21.6
	2021	15,536	25.1
全国平均	2021	-	26.2

(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


特定保健指導実施率の状況

指標5【特定保健指導実施率（被保険者・初回面談）】

①2021年度の全支部の実施率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部の実施率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)

指標6【特定保健指導実施率（被保険者・実績評価）】

①2021年度の全支部の実施率と全国平均 (%)



②2018年度から2021年度の自支部の実施率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


指標7【特定保健指導実施率（被扶養者・初回面談）】

①2021年度の全支部の実施率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部の実施率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


指標8【特定保健指導実施率（被扶養者・実績評価）】

①2021年度の全支部の実施率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部の実施率と全国順位及び全国平均




(データソース：各支部からの報告による請求ベースのデータ)


【メタボリックシンドローム該当者減少率】

①2020年度の全支部の減少率と全国平均

(%)



②2017年度から2020年度の自支部の減少率と全国順位及び全国平均




(データソース：国への報告データ「内臓脂肪症候群該当者の減少率」)

Ⅱ 生活習慣病リスク保有者の割合(男性)

【生活習慣病リスクの判定基準】※2021年度版のスコアリングレポートでは一部の基準を変更しました

- **メタボリックリスク** : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち2つ以上のリスクに該当する者
- **メタボリック予備群** : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち1つのリスクに該当する者
- **腹囲リスク** : 男性85cm以上、女性90cm以上
- **血圧リスク** : 収縮期130mmHg以上 又は 拡張期85mmHg以上 又は 服薬
- **代謝(血糖)リスク**※ : 空腹時血糖110mg/dl以上 又は HbA1c6.0%以上 又は 服薬
- **脂質リスク**※ : 中性脂肪150mg/dl以上 又は HDLコレステロール40mg/dl未満 又は 服薬

【生活習慣病リスク保有者割合(2021年度)】



※ 順位は1位が最もリスクが低い(良い)状態です


指標1	メタボリックリスク	C
指標2	メタボリック及びメタボ予備群	C
指標3	腹囲リスク	C
指標4	血圧リスク	B
指標5	代謝(血糖)リスク	C
指標6	脂質リスク	C

A: 順位1位~10位、B: 順位11位~37位、C: 順位38位~47位

指標1【メタボリックリスク保有者の割合】


①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均

(%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標2【メタボリスク及びメタボ予備群の割合】


①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均


(%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標3 【腹囲リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (％)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標4 【血圧リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (％)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標5【代謝(血糖)リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標6【脂質リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)



②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

Ⅱ 生活習慣病リスク保有者の割合(女性)

【生活習慣病リスクの判定基準】※2021年度版のスコアリングレポートでは一部の基準を変更しました

- **メタボリックリスク** : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち2つ以上のリスクに該当する者
- **メタボリック予備群** : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち1つのリスクに該当する者
- **腹囲リスク** : 男性85cm以上、女性90cm以上
- **血圧リスク** : 収縮期130mmHg以上 又は 拡張期85mmHg以上 又は 服薬
- **代謝(血糖)リスク※** : 空腹時血糖110mg/dl以上 又は HbA1c6.0%以上 又は 服薬
- **脂質リスク※** : 中性脂肪150mg/dl以上 又は HDLコレステロール40mg/dl未満 又は 服薬

【生活習慣病リスク保有者割合(2021年度)】




※ 順位は1位が最もリスクが低い(良い)状態です

指標1	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">メタボリックリスク</th></tr> <tr><td style="background-color: #c0504d; color: white; font-size: 2em;">C</td></tr> </table>	メタボリックリスク	C
メタボリックリスク			
C			
指標2	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">メタボリスク及びメタボ予備群</th></tr> <tr><td style="background-color: #c0504d; color: white; font-size: 2em;">C</td></tr> </table>	メタボリスク及びメタボ予備群	C
メタボリスク及びメタボ予備群			
C			
指標3	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">腹囲リスク</th></tr> <tr><td style="background-color: #c0504d; color: white; font-size: 2em;">C</td></tr> </table>	腹囲リスク	C
腹囲リスク			
C			
指標4	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">血圧リスク</th></tr> <tr><td style="background-color: #f1c40f; color: white; font-size: 2em;">B</td></tr> </table>	血圧リスク	B
血圧リスク			
B			
指標5	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">代謝(血糖)リスク</th></tr> <tr><td style="background-color: #f1c40f; color: white; font-size: 2em;">B</td></tr> </table>	代謝(血糖)リスク	B
代謝(血糖)リスク			
B			
指標6	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th style="background-color: #2c4e64; color: white;">脂質リスク</th></tr> <tr><td style="background-color: #f1c40f; color: white; font-size: 2em;">B</td></tr> </table>	脂質リスク	B
脂質リスク			
B			


A: 順位1位~10位、B: 順位11位~37位、C: 順位38位~47位

指標1【メタボリックリスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標2【メタボリスク及びメタボ予備群の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標3 【腹囲リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標4 【血圧リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標5【代謝(血糖)リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)




②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース:「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標6【脂質リスク保有者の割合】

①2021年度の全支部のリスク保有率と全国平均 (%)



②2018年度から2021年度の自支部のリスク保有率と全国順位及び全国平均 (%)




(データソース:「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

Ⅲ生活習慣要改善者の割合(男性)

【生活習慣要改善者の判定基準】※2021年度版のスコアリングレポートでは一部の基準を変更しました

- 喫煙習慣がある者 : 「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者の割合
- 体重10kg以上増加者 : 「20歳の時の体重から10kg以上増加している」に「はい」と回答した者の割合
- 運動習慣要改善者※ : 「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の3問中2問以上に「いいえ」と回答した者の割合
(3問中2問以上)
- 食事習慣要改善者※ : 「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の4問中2問以上に「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合
(4問中2問以上)
- 飲酒習慣要改善者※ : 「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」(毎日2合以上又は時々3合以上)に「毎日2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者の割合
- 睡眠で休養が取れて : 「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の割合
いない者

【生活習慣病リスク保有者割合(2021年度)】




※ 順位は1位が最もリスクが低い(良い)状態です

指標1	喫煙習慣がある者の割合	B	指標2	体重10kg以上増加者の割合	C
指標3	運動習慣要改善者の割合	B	指標4	食事習慣要改善者の割合	B
指標5	飲酒習慣要改善者の割合	A	指標6	睡眠で休養が取れていない者の割合	A


A: 順位1位~10位、B: 順位11位~37位、C: 順位38位~47位

指標1 【喫煙習慣がある者の割合】

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)




②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標2 【体重10kg以上増加者の割合】

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)


指標3【運動習慣(3問中2問以上)要改善者[※]の割合】

※「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の3問中2問以上「いいえ」と回答した者の割合。個々の詳細データはP.25を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)


指標4【食事習慣(4問中2問以上)要改善者[※]の割合】

※「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の4問中2問以上に「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合。個々の詳細データはP.26を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標5【飲酒習慣（毎日2合以上又は時々3合以上）要改善者※の割合】

※「お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に「毎日2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者の割合。個々の詳細データはP. 27を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均

(%)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均


(%)



(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)


指標6【睡眠で休養が取れていない者の割合】

①2021年度の全支部の割合と全国平均



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均

(%)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

Ⅲ生活習慣要改善者の割合(女性)


【生活習慣要改善者の判定基準】※2021年度版のスコアリングレポートでは一部の基準を変更しました

- 喫煙習慣がある者 : 「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者の割合
- 体重10kg以上増加者 : 「20歳の時の体重から10kg以上増加している」に「はい」と回答した者の割合
- 運動習慣要改善者※ : 「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」の3問中2問以上に「いいえ」と回答した者の割合
(3問中2問以上)
- 食事習慣要改善者※ : 「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の4問中2問以上に「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合
(4問中2問以上)
- 飲酒習慣要改善者※ : 「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」(毎日2合以上又は時々3合以上)に「毎日2合以上又は時々3合以上」と回答した者の割合
- 睡眠で休養が取れていない者 : 「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の割合

【生活習慣病リスク保有者割合(2021年度)】




※ 順位は1位が最もリスクが低い(良い)状態です



A: 順位1位~10位、B: 順位11位~37位、C: 順位38位~47位

指標1【喫煙習慣がある者の割合】


①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)




指標3【運動習慣(3問中2問以上)要改善者[※]の割合】

※「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」に2問以上「いいえ」と回答した者の割合。個々の詳細データはP.25を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)


指標4【食事習慣(4問中2問以上)要改善者[※]の割合】

※「人と比較して食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」「朝食を抜くことが週に3回以上ある」の4問中2問以上に「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合。個々の詳細データはP.26を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)



②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)


指標5【飲酒習慣（毎日2合以上又は時々3合以上）要改善者の割合】

※「お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度」「飲酒日の1日当たりの飲酒量」に「毎日2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者の割合。個々の詳細データはP. 27を参照してください。

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)




②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)




(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

指標6【睡眠で休養が取れていない者の割合】

①2021年度の全支部の割合と全国平均 (％)




②2018年度から2021年度の自支部の割合と全国順位及び全国平均 (％)



(データソース：「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」より各項目の年齢調整割合)

IV 医療費の状況


①2020年度の全支部の1人あたり医療費（合計）と全国平均 (円)




②2017年度から2020年度の自支部の各種1人あたり医療費と全国平均 (円)

	年度	合計	入院	入院外	調剤	歯科	その他
熊本支部	2017	187,371	55,771	74,783	33,979	17,551	5,287
	2018	189,318	57,731	75,592	33,193	17,818	4,983
	2019	193,258	58,299	77,122	34,376	18,290	5,171
	2020	191,322	58,408	73,531	34,402	19,709	5,272
全国平均	2020	180,291	49,326	69,917	35,596	20,585	4,866

③2017年度から2020年度の自支部の各種1人あたり医療費と全国順位及び全国平均
 【1人あたり医療費(合計)】 【1人あたり入院医療費】 【1人あたり入院外医療費】



【1人あたり調剤医療費】 【1人あたり歯科医療費】 【1人あたりその他医療費】




(データソース：協会けんぽの都道府県支部別医療費の状況（運営委員会公表資料）のバックデータから年齢構成を標準化した1人あたり医療費を算出)


V生活習慣に関する参考データ

【運動習慣の詳細】

【運動習慣の詳細(2021年度男性)】



【運動習慣の詳細(2021年度女性)】



(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
運動習慣要改善者の割合 (3問中2問以上「いいえ」と回答した者の割合)	2018	69.0	70.1	74.4	77.5
	2019	68.2	69.4	73.9	77.1
	2020	67.7	68.1	74.2	76.8
	2021	67.0	68.4	73.7	76.4

(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合	2018	76.6	76.8	84.3	86.0
	2019	76.0	75.8	84.0	85.9
	2020	75.2	74.7	84.4	85.8
	2021	74.5	75.1	84.0	85.6

(%)


	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
1日1時間以上の歩行を実施していない者の割合	2018	62.6	64.5	64.6	67.2
	2019	61.5	63.1	63.9	66.2
	2020	60.7	61.3	63.5	65.4
	2021	59.9	61.8	62.7	65.2

(%)


	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速くない者の割合	2018	53.9	55.6	57.6	61.6
	2019	53.9	55.8	57.4	61.5
	2020	54.7	56.1	58.4	62.0
	2021	54.5	56.1	58.4	61.7

【食事習慣の詳細】

【食事習慣の詳細(2021年度男性)】



【食事習慣の詳細(2021年度女性)】



(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
食事習慣要改善者の割合 (4問中2問以上に「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合)	2018	57.7	57.1	49.3	49.4
	2019	57.8	56.6	49.3	49.1
	2020	56.3	55.5	47.7	47.8
	2021	56.7	55.6	47.7	47.8

(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
人と比較して食べる速度が速い者の割合	2018	37.0	38.8	30.3	32.1
	2019	37.0	38.2	29.9	31.4
	2020	36.5	37.3	29.4	30.5
	2021	36.5	37.5	29.3	30.5

(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合	2018	41.7	39.0	25.9	22.6
	2019	41.5	38.8	25.8	22.9
	2020	38.5	36.7	23.5	21.1
	2021	38.3	36.4	23.2	20.8

(%)


	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
間食頻度「毎日」又は「時々」の者の割合	2018	13.8	11.4	30.1	26.5
	2019	14.0	11.1	30.5	27.0
	2020	13.6	11.0	29.7	26.6
	2021	14.1	11.2	30.2	27.1

(%)


	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合	2018	27.1	29.1	17.6	18.2
	2019	27.5	29.5	18.1	18.6
	2020	27.5	29.4	18.0	18.4
	2021	28.4	30.4	19.0	19.5

【飲酒習慣の詳細】

【飲酒習慣の詳細(2021年度男性)】



【飲酒習慣の詳細(2021年度女性)】



(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
飲酒習慣要改善者の割合 (「毎日2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者の割合)	2018	19.1	16.0	5.0	3.2
	2019	18.9	15.8	5.1	3.4
	2020	18.1	15.6	4.9	3.4
	2021	17.7	14.6	4.9	3.5

(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
お酒を飲む頻度が毎日の者の割合	2018	39.6	41.0	16.5	14.5
	2019	38.8	40.1	16.5	14.5
	2020	38.2	39.6	16.7	15.2
	2021	37.5	39.6	16.6	15.5

(%)

	年度	全国男性	熊本支部男性	全国女性	熊本支部女性
飲酒日の1日当たりの飲酒量が2合以上の者の割合	2018	6.6	5.4	1.8	1.1
	2019	6.7	5.4	1.8	1.2
	2020	6.0	5.1	1.6	0.9
	2021	5.8	4.2	1.5	0.9

Ⅵ各指標の算出方法

【使用データ】

- 健診受診率、特定保健指導実施率…各支部からの報告による請求ベースのデータ(2018-2021)
- メタボリックシンドローム減少率…国への報告データ「内臓脂肪症候群該当者の減少率」(2017-2020)
- 生活習慣病リスク及び生活習慣要改善者…「特定健診、特定保健指導分析データ分析報告書」の支部別全受診者(40歳-74歳)より各項目の年齢調整割合(2018-2021)
- 医療費…協会けんぽの都道府県支部別医療費の状況(運営委員会公表資料)のバックデータから年齢構成を標準化した1人当たり医療費(2017-2020)
(入院外医療費は調剤除く)
(その他医療費は食事療養費、訪問看護療養費、療養費、移送費の合計)

【生活習慣病リスク及び生活習慣リスクの判定基準】※2021年度版のスコアリングレポートでは一部の基準を変更しました

- メタボリックリスク : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち2つ以上のリスクに該当する者
- メタボリック予備群 : 腹囲リスク該当かつ血圧、代謝、脂質のうち1つのリスクに該当する者
- 腹囲リスク : 男性85cm以上、女性90cm以上
- 血圧リスク : 収縮期130mmHg以上 又は 拡張期85mmHg以上 又は 服薬
- 代謝(血糖)リスク※ : 空腹時血糖110mg/dl以上 又は HbA1c6.0%以上 又は 服薬
- 脂質リスク※ : 中性脂肪150mg/dl以上 又は HDLコレステロール40mg/dl未満 又は 服薬
- 喫煙習慣がある者 : 「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した者の割合
- 体重10kg以上増加者 : 「20歳の時の体重から10kg以上増加している」に「はい」と回答した者の割合
- 運動習慣要改善者※ : 「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上1年以上実施している」
(3間中2間以上) 「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」
「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」
に2間以上「いいえ」と回答した者の割合
- 食事習慣要改善者※ : 「人と比較して食べる速度が速い」
(4間中2間以上) 「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」
「朝昼夜の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」
「朝食を抜くことが週に3回以上ある」
に2間以上「はい(速い・毎日又は時々)」と回答した者の割合
- 飲酒習慣要改善者※ : 「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」
(毎日2合以上又は時々3合以上) 「飲酒日の1日当たりの飲酒量」
に「毎日2合以上」又は「時々3合以上」と回答した者の割合
- 睡眠で休養が取れていない者 : 「睡眠で休養が十分とれている」に「いいえ」と回答した者の割合

【順位の判定について】

それぞれの項目において、順位の1位は以下の状態を表しています。

- 健診受診率 …受診率が最も高い=1位
- 特定保健指導実施率 …実施率が最も高い=1位
- メタボリックシンドローム該当者減少率 …減少率が最も高い=1位
- 生活習慣病リスク保有者の割合 …リスク保有者の割合が低い=1位
- 生活習慣要改善者の割合 …要改善者の割合が低い=1位
- 医療費 …医療費が低い=1位

指標○	○○○○○ A (順位1位~10位)	○○○○○ B (順位11位~37位)	○○○○○ C (順位38位~47位)
-----	--------------------------	---------------------------	---------------------------