




4. 生活習慣病予防健診 男女別リスク保有割合

※H26全国平均を1としたときのリスク保有割合
【医療費分析用データ（平成26年度）より集計】

男性



女性



| 男性 | メタボリックシンドロームのリスク保有率 | 腹囲のリスク保有率 | 血圧のリスク保有率 | 脂質のリスク保有率 | 代謝のリスク保有率 | 喫煙者の割合 (参考) | BMIのリスク保有率 (参考) | 中性脂肪のリスク保有率 (参考) | HDLコレステロールのリスク保有率 (参考) |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 三重 | 18.0% | 43.8% | 42.7% | 34.6% | ↑ 18.5% | 42.6% | 31.9% | 26.2% | ↑ 8.6% |
| 全国 | 19.2% | 45.7% | 46.9% | 35.0% | 17.9% | 43.6% | 32.9% | 27.6% | 8.1% |

| 女性 | メタボリックシンドロームのリスク保有率 | 腹囲のリスク保有率 | 血圧のリスク保有率 | 脂質のリスク保有率 | 代謝のリスク保有率 | 喫煙者の割合 (参考) | BMIのリスク保有率 (参考) | 中性脂肪のリスク保有率 (参考) | HDLコレステロールのリスク保有率 (参考) |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 三重 | 4.0% | 11.7% | 28.3% | ↑ 16.5% | ↑ 8.1% | 14.5% | 18.3% | ↑ 8.7% | 1.2% |
| 全国 | 4.1% | 12.7% | 29.4% | 15.1% | 7.4% | 17.0% | 19.2% | 8.4% | 1.2% |