


# 都道府県別医療費に関する リーダーチャート等


平成20年度

# 北海道(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

北海道			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.3%
2	虚血性心疾患	○	5.0%
3	良性新生物		4.7%
4	他の消化器系の疾患		4.6%
5	肺の悪性新生物	○	3.2%
6	他の心疾患	○	3.0%
7	他の妊娠、分娩及び産後		2.8%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	骨折		2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

北海道			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.8%
2	糖尿病	○	6.3%
3	喘息		5.1%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
5	他の急性上気道感染症		2.9%
6	他の消化器系の疾患		2.5%
7	アレルギー性鼻炎		2.3%
8	腎不全		2.3%
9	胃及び十二指腸潰瘍		2.3%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			22.2%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 北海道(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	北海道			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	13.9%	18.2%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	37.1%	47.0%	11.2%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	39.9%	44.6%	27.6%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	26.8%	33.6%	9.2%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.4%	20.0%	7.0%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	49.2%	55.6%	32.3%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	30.4%	34.7%	19.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	24.2%	30.3%	8.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	7.1%	9.4%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 青森県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

青森県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.3%
2	良性新生物		5.1%
3	他の妊娠、分娩及び産じょく		5.0%
4	他の消化器系の疾患		4.8%
5	虚血性心疾患	○	4.2%
6	脳梗塞	○	3.4%
7	他の神経系の疾患		3.0%
8	脳内出血	○	2.9%
9	胃の悪性新生物	○	2.9%
10	肺の悪性新生物	○	2.6%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			22.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

青森県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	13.0%
2	糖尿病	○	6.1%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
4	急性気管支及び細気管支炎		3.7%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	喘息		3.4%
7	アレルギー性鼻炎		2.9%
8	皮膚炎及びひび割れ		2.3%
9	胃及び十二指腸潰瘍		2.0%
10	他の皮膚及び皮下組織の疾患		1.9%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			23.1%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	6.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 青森県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	青森県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.7%	18.1%	2.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.1%	45.8%	13.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	40.1%	46.3%	29.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.7%	31.5%	6.9%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	17.5%	22.7%	8.1%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	52.1%	66.4%	26.5%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.5%	32.5%	21.3%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	20.4%	28.4%	6.3%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.6%	8.2%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年8月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 岩手県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

岩手県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の妊娠、分娩及び産じょく		5.4%
3	他の消化器系の疾患		5.1%
4	良性新生物		4.5%
5	統合失調症及び妄想性障害		3.6%
6	虚血性心疾患	○	2.8%
7	肺の悪性新生物	○	2.5%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
9	他の神経系の疾患		2.4%
10	白血病	○	2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	15.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

岩手県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	13.1%
2	糖尿病	○	5.9%
3	喘息		3.6%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.6%
5	皮膚炎及びびん疹		2.7%
6	急性気管支及び細気管支炎		2.7%
7	他の急性上気道感染症		2.5%
8	アレルギー性鼻炎		2.4%
9	屈折及び調節の障害		2.2%
10	他の神経系の疾患		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.6%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 岩手県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	岩手県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.5%	16.6%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.4%	47.2%	14.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.0%	41.6%	26.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	26.5%	36.2%	9.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.1%	19.7%	6.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	41.3%	55.6%	15.7%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.2%	32.9%	19.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	24.8%	33.8%	8.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.8%	8.4%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 宮城県 (平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

宮城県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.9%
2	虚血性心疾患	○	6.3%
3	他の消化器系の疾患		5.7%
4	良性新生物		4.5%
5	他の心疾患	○	4.0%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
7	胃の悪性新生物	○	2.7%
8	肺の悪性新生物	○	2.6%
9	他の神経系の疾患		2.4%
10	骨折		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	23.5%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

宮城県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	13.7%
2	糖尿病	○	6.3%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.5%
4	喘息		4.4%
5	他の急性上気道感染症		3.4%
6	皮膚炎及びひき疹		3.0%
7	急性気管支及び細気管支炎		2.4%
8	アレルギー性鼻炎		2.4%
9	他の消化器系の疾患		2.2%
10	他の眼及び付属器の疾患		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	24.5%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひき疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合

# 宮城県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較



健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

宮城県		
全体	男性	女性
14.0%	19.2%	3.3%
37.3%	48.6%	13.9%
45.3%	51.0%	33.6%
25.0%	33.0%	8.6%
14.7%	18.6%	6.8%
41.7%	52.7%	18.8%
29.4%	33.7%	20.6%
22.7%	29.9%	7.9%
6.4%	8.9%	1.4%



全国		
全体	男性	女性
11.9%	16.5%	2.8%
34.0%	45.2%	11.9%
37.1%	42.3%	26.8%
24.5%	32.3%	9.0%
14.4%	18.1%	7.0%
39.2%	49.9%	18.0%
26.2%	30.6%	17.6%
22.4%	29.5%	8.4%
5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 秋田県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

秋田県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.3%
2	他の消化器系の疾患		5.0%
3	良性新生物		4.9%
4	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
5	虚血性心疾患	○	3.0%
6	胃の悪性新生物	○	2.9%
7	他の心疾患	○	2.7%
8	肺の悪性新生物	○	2.6%
9	骨折		2.6%
10	脳梗塞	○	2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			22.0%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

秋田県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	12.1%
2	糖尿病	○	5.4%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.3%
4	喘息		3.6%
5	他の急性上気道感染症		3.1%
6	屈折及び調節の障害		2.7%
7	急性気管支及び細気管支炎		2.6%
8	皮膚炎及びひび割れ		2.5%
9	胃及び十二指腸炎		2.4%
10	他の消化器系の疾患		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.8%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 秋田県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	秋田県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.7%	19.5%	3.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.4%	47.3%	13.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.8%	46.2%	28.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.3%	36.4%	9.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	17.1%	23.2%	8.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.9%	53.8%	14.7%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.0%	33.2%	20.5%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.8%	34.4%	8.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.5%	6.8%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 山形県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一検種診、付加種診)データ  
年次: 平成20年度

### 入院の医療費の上位10疾病

山形県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.7%
2	他の消化器系の疾患		5.0%
3	他の妊娠、分娩及び産じょく		4.5%
4	良性新生物		4.3%
5	虚血性心疾患	○	3.5%
6	胃の悪性新生物	○	3.3%
7	統合失調症及び妄想性障害		3.2%
8	他の損傷及び他の外因の影響		3.0%
9	骨折		2.8%
10	関節症		2.8%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	13.6%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

山形県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	13.3%
2	糖尿病	○	5.7%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	5.1%
4	喘息		3.8%
5	他の急性上気道感染症		3.5%
6	皮膚炎及び湿疹		2.7%
7	アレルギー性鼻炎		2.5%
8	良性新生物		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	24.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。

注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 山形県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	山形県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	9.0%	14.2%	2.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	32.8%	46.6%	13.1%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	39.3%	47.4%	28.6%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.6%	35.8%	8.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	10.8%	14.7%	5.1%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	35.6%	50.3%	14.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.5%	30.5%	18.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.0%	33.5%	8.0%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.7%	7.2%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 福島県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

福島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.3%
2	良性新生物		4.8%
3	虚血性心疾患	○	4.6%
4	他の消化器系の疾患		4.6%
5	他の心疾患	○	3.3%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.3%
7	胃の悪性新生物	○	2.9%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
9	脳梗塞	○	2.7%
10	骨折		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

福島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	13.7%
2	糖尿病	○	6.3%
3	喘息		4.8%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.9%
5	他の急性上気道感染症		3.4%
6	急性気管支及び細気管支炎		3.3%
7	腎不全		2.8%
8	皮膚炎及び湿疹		2.5%
9	アレルギー性鼻炎		2.4%
10	他の消化器系の疾患		1.9%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	23.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 福島県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	福島県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	125%	18.7%	3.0%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	32.4%	45.9%	11.8%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	42.2%	48.8%	32.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.1%	33.7%	9.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.2%	20.3%	7.5%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	38.6%	52.4%	17.5%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.4%	33.3%	20.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.6%	30.2%	8.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.6%	9.7%	1.7%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 茨城県 (平成20年度)


### 医療費に関するレーダーチャート



### 健診データに関するレーダーチャート(男性)



### 健診データに関するレーダーチャート(女性)



#### 入院の医療費の上位10疾病

茨城県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.3%
2	虚血性心疾患	○	5.1%
3	他の消化器系の疾患		4.7%
4	良性新生物		4.3%
5	他の心疾患	○	4.1%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.6%
7	統合失調症及び妄想性障害		3.0%
8	肺の悪性新生物	○	2.9%
9	骨折		2.6%
10	胃の悪性新生物	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

#### 入院外の医療費の上位10疾病

茨城県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.9%
2	糖尿病	○	6.5%
3	喘息		4.4%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
5	他の急性上気道感染症		3.2%
6	アレルギー性鼻炎		2.8%
7	皮膚炎及び湿疹		2.6%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.6%
9	屈折及び調節の障害		2.3%
10	胃及び十二指腸潰瘍		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.4%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 茨城県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	茨城県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	13.9%	19.8%	3.5%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.2%	47.7%	12.7%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	39.9%	46.0%	29.1%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.7%	34.2%	10.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.3%	19.7%	7.7%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.7%	49.4%	16.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.8%	33.5%	20.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.2%	30.7%	9.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.8%	9.8%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 栃木県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

栃木県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.8%
2	他の消化器系の疾患		4.7%
3	良性新生物		4.6%
4	他の妊娠、分娩及び産じょく		4.1%
5	他の心疾患	○	3.5%
6	虚血性心疾患	○	3.4%
7	肺の悪性新生物	○	2.9%
8	胃の悪性新生物	○	2.8%
9	脳梗塞	○	2.6%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	23.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

栃木県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	12.1%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.4%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.2%
6	皮膚炎及び湿疹		2.9%
7	アレルギー性鼻炎		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.4%
9	他の消化器系の疾患		2.3%
10	胃及び十二指腸炎		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに適合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 栃木県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	栃木県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.2%	17.0%	3.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.8%	47.4%	13.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.5%	43.3%	28.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	26.4%	34.3%	11.2%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.6%	17.2%	6.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.6%	51.2%	17.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	29.0%	33.5%	20.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	24.7%	32.0%	10.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.2%	7.3%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 群馬県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

群馬県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	5.9%
2	虚血性心疾患	○	5.2%
3	他の心疾患	○	5.0%
4	他の消化器系の疾患		4.4%
5	良性新生物		3.5%
6	統合失調症及び妄想性障害		3.3%
7	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
8	骨折		2.8%
9	妊娠及び胎児発育に関連する障害		2.7%
10	脳梗塞	○	2.6%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	18.6%
-----------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-----------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

群馬県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.4%
2	糖尿病	○	6.2%
3	喘息		5.1%
4	他の急性上気道感染症		3.8%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.8%
6	皮膚炎及びび癬疹		2.7%
7	腎不全		2.6%
8	アレルギー性鼻炎		2.6%
9	急性気管支及び細気管支炎		2.4%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.2%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	21.3%
-----------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びび癬疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-----------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 群馬県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	群馬県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	13.2%	17.9%	3.5%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.4%	45.3%	11.7%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	40.6%	45.7%	30.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	26.6%	34.0%	11.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.9%	18.2%	7.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.6%	49.9%	17.9%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.0%	29.8%	18.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	24.1%	30.6%	10.3%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.9%	9.3%	1.7%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 埼玉県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

埼玉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.9%
3	良性新生物		4.9%
4	虚血性心疾患	○	3.8%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.4%
6	脳梗塞	○	3.1%
7	他の心疾患	○	3.0%
8	骨折		2.8%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	統合失調症及び妄想性障害		2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.0%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

埼玉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.8%
2	糖尿病	○	5.9%
3	喘息	○	4.6%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.8%
5	他の急性上気道感染症		3.5%
6	アレルギー性鼻炎		3.2%
7	皮膚炎及びび瘡		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.1%
9	屈折及び調節の障害		2.1%
10	胃及び十二指腸潰瘍		2.0%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.3%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息	○	4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びび瘡		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを集計した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。

注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 埼玉県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	埼玉県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.4%	15.8%	3.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.3%	44.4%	12.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	35.7%	40.3%	27.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.5%	32.0%	10.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.6%	17.0%	7.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.0%	48.5%	21.0%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.4%	30.7%	18.3%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.2%	28.9%	9.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.4%	9.0%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 千葉県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

千葉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	虚血性心疾患	○	4.9%
3	他の消化器系の疾患		4.7%
4	良性新生物		4.3%
5	他の心疾患	○	3.2%
6	統合失調症及び妄想性障害		2.9%
7	他の妊娠、分娩及び産後		2.8%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.7%
9	骨折		2.6%
10	糖尿病	○	2.6%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	18.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

千葉県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	12.0%
2	糖尿病	○	6.7%
3	喘息		4.8%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.8%
5	他の急性上気道感染症		3.4%
6	腎不全		3.3%
7	アレルギー性鼻炎		2.7%
8	皮膚炎及びびん疹		2.5%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.5%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 千葉県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	千葉県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.9%	16.8%	2.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.4%	46.9%	13.8%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	35.7%	40.8%	26.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.7%	32.8%	9.6%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.8%	17.5%	6.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.7%	49.6%	21.2%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.2%	32.8%	19.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.6%	29.9%	9.0%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.1%	8.6%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 東京都(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

東京都			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.0%
2	他の消化器系の疾患		5.1%
3	良性新生物		5.0%
4	虚血性心疾患	○	3.8%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.6%
6	他の心疾患	○	3.3%
7	肺の悪性新生物	○	2.9%
8	骨折		2.8%
9	胃の悪性新生物	○	2.5%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.6%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

東京都			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.3%
2	糖尿病	○	5.4%
3	喘息		4.8%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患		3.9%
5	他の急性上気道感染症		3.9%
6	アレルギー性鼻炎		3.4%
7	皮膚炎及びひび割れ		3.2%
8	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	他の皮膚及び皮下組織の疾患		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.7%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 東京都(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	東京都			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタリックシンドロームのリスク保有率	12.2%	16.5%	2.4%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	36.0%	46.9%	10.9%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	34.3%	39.5%	22.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.1%	32.4%	8.2%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.9%	17.4%	5.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.2%	46.7%	22.0%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.6%	31.3%	15.6%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.8%	29.4%	7.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.4%	8.7%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 神奈川県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

神奈川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	虚血性心疾患	○	5.0%
3	他の消化器系の疾患		4.8%
4	良性新生物		4.7%
5	他の心疾患	○	4.4%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
7	肺の悪性新生物	○	2.8%
8	骨折		2.7%
9	脳梗塞	○	2.4%
10	脳内出血	○	2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	24.2%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

神奈川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.5%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		5.1%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.8%
5	他の急性上気道感染症		3.7%
6	アレルギー性鼻炎		3.5%
7	皮膚炎及びびび		3.0%
8	他の消化器系の疾患		2.1%
9	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)		2.1%
10	胃及び十二指腸炎		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびび		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

## 神奈川県(平成20年度)


健診データについての全国値との比較

健診の指標	神奈川県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.1%	16.7%	2.7%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.2%	45.0%	11.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.8%	43.3%	26.1%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.9%	32.3%	9.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.5%	16.9%	6.3%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	40.6%	48.7%	23.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.6%	31.2%	17.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.4%	30.2%	8.9%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.0%	6.8%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%


データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ

年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値


注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 新潟県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

新潟県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	良性新生物		4.4%
3	統合失調症及びび妄想性障害		3.8%
4	他の消化器系の疾患		3.4%
5	肺の悪性新生物	○	3.3%
6	他の神経系の疾患		3.1%
7	他の心疾患	○	3.1%
8	胃の悪性新生物	○	2.8%
9	悪性リンパ腫	○	2.3%
10	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.9%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

新潟県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.5%
2	糖尿病	○	5.6%
3	喘息		5.0%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.7%
5	他の急性上気道感染症		3.7%
6	急性気管支及び細気管支炎		2.5%
7	皮膚炎及びかゆ疹		2.5%
8	アレルギー性鼻炎		2.5%
9	胃及び十二指腸潰瘍		2.2%
10	他の消化器系の疾患		2.0%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.8%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びかゆ疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月

注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。

注:割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 新潟県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	新潟県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	9.3%	13.4%	1.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	31.0%	41.8%	11.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	35.2%	41.7%	23.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	20.7%	28.3%	7.0%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	11.4%	14.8%	5.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.0%	51.5%	16.3%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	22.2%	26.1%	15.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	19.1%	26.0%	6.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.5%	6.5%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 富山県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

富山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.2%
2	他の消化器系の疾患		5.4%
3	良性新生物		4.2%
4	虚血性心疾患	○	4.1%
5	他の心疾患	○	3.4%
6	骨折		3.0%
7	胃の悪性新生物	○	2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.6%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.2%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

富山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.5%
2	糖尿病	○	6.7%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.7%
4	喘息		3.8%
5	急性気管支及び細気管支炎		2.8%
6	他の急性上気道感染症		2.8%
7	皮膚炎及び湿疹		2.4%
8	腎不全		2.1%
9	アレルギー性鼻炎		2.1%
10	屈折及び調節の障害		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

## 富山県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較



健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

富山県	富山県		
	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.3%	16.4%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.6%	45.4%	13.5%
血圧のリスク保有率	38.0%	43.8%	28.0%
脂質のリスク保有率	24.4%	33.4%	9.1%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.9%	20.7%	7.6%
喫煙者の割合	37.7%	51.8%	13.5%
BMIのリスク保有率(参考)	24.6%	29.3%	16.5%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.2%	30.3%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.4%	9.2%	1.6%



全国	全国		
	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 石川県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

石川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.6%
2	虚血性心疾患	○	5.3%
3	他の消化器系の疾患		4.5%
4	良性新生物		4.0%
5	統合失調症及び妄想性障害		3.3%
6	他の神経系の疾患		3.1%
7	糖尿病	○	3.1%
8	他の心疾患	○	3.1%
9	骨折		2.7%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			18.2%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

石川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.5%
2	糖尿病	○	6.3%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.7%
4	他の急性上気道感染症		3.4%
5	喘息		3.4%
6	屈折及び調節の障害		2.6%
7	腎不全		2.6%
8	皮膚炎及びひび割れ		2.6%
9	他の消化器系の疾患		2.2%
10	アレルギー性鼻炎		2.0%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 石川県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	石川県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.9%	15.9%	2.6%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	32.4%	44.6%	11.2%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.0%	43.1%	26.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.1%	30.0%	8.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.2%	17.3%	6.1%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.5%	48.7%	15.5%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	24.0%	28.9%	15.7%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	19.9%	27.0%	7.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.0%	8.6%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 福井県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

福井県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.1%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	虚血性心疾患	○	4.7%
4	良性新生物		4.0%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.8%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	胃の悪性新生物	○	2.7%
8	脳梗塞	○	2.7%
9	骨折	○	2.6%
10	肺の悪性新生物	○	2.6%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

福井県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.8%
2	糖尿病	○	6.2%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.5%
4	皮膚炎及び湿疹		3.2%
5	他の急性上気道感染症		3.0%
6	喘息		3.0%
7	腎不全		2.7%
8	アレルギー性鼻炎		2.6%
9	急性気管支及び細気管支炎		2.3%
10	他の消化器系の疾患		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.4%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 福井県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	福井県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.2%	16.8%	3.0%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	32.2%	45.9%	12.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	35.2%	41.3%	26.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	21.9%	31.2%	8.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.4%	18.2%	6.5%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	32.2%	46.6%	11.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	23.3%	28.2%	16.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	19.8%	28.1%	7.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.5%	8.5%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 山梨県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一検複診、付加複診)データ  
年次: 平成20年度

### 入院の医療費の上位10疾病

山梨県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	5.9%
2	他の消化器系の疾患		5.0%
3	良性新生物		4.3%
4	統合失調症及び妄想性障害		3.8%
5	脳梗塞	○	3.2%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
7	虚血性心疾患	○	3.2%
8	他の心疾患	○	3.0%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.9%
10	妊娠及び胎児発育に関する障害		2.9%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	15.3%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

山梨県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.9%
2	糖尿病	○	6.0%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.2%
4	喘息		3.9%
5	他の急性上気道感染症		3.8%
6	アレルギー性鼻炎		3.4%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	腎不全		2.4%
9	屈折及び関節の障害		2.3%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに適合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合

# 山梨県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較



健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

山梨県		
全体	男性	女性
12.8%	18.3%	3.4%
32.4%	45.0%	10.9%
36.5%	42.3%	26.5%
23.2%	31.6%	9.0%
11.1%	14.5%	5.4%
39.6%	51.4%	19.7%
25.0%	30.1%	16.2%
21.4%	29.0%	8.5%
5.0%	7.3%	1.1%



全国		
全体	男性	女性
11.9%	16.5%	2.8%
34.0%	45.2%	11.9%
37.1%	42.3%	26.8%
24.5%	32.3%	9.0%
14.4%	18.1%	7.0%
39.2%	49.9%	18.0%
26.2%	30.6%	17.6%
22.4%	29.5%	8.4%
5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 長野県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

長野県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.1%
2	他の消化器系の疾患		4.9%
3	良性新生物		4.0%
4	他の妊娠、分娩及び産じょく		4.0%
5	虚血性心疾患	○	3.1%
6	骨折		3.1%
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.9%
8	他の神経系の疾患		2.7%
9	他の心疾患	○	2.6%
10	脳梗塞	○	2.6%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	16.5%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

長野県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.0%
2	糖尿病	○	5.6%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
4	喘息		3.2%
5	他の急性上気道感染症		3.1%
6	腎不全		3.0%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.7%
8	アレルギー性鼻炎		2.5%
9	急性気管支及び細気管支炎		2.1%
10	他の神経系の疾患		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.6%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 長野県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	長野県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.8%	16.0%	2.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	29.3%	41.3%	10.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.5%	44.0%	29.9%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.2%	30.7%	8.9%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.8%	18.0%	7.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	33.9%	47.5%	12.8%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	23.1%	27.6%	16.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	20.5%	28.3%	8.4%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.5%	6.7%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 岐阜県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

岐阜県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.9%
2	虚血性心疾患	○	5.4%
3	他の消化器系の疾患		5.0%
4	良性新生物		4.7%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.3%
6	他の心疾患	○	3.2%
7	胃の悪性新生物	○	2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.6%
9	骨折		2.5%
10	妊娠及び胎児発育に関連する障害		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

岐阜県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.0%
2	糖尿病	○	6.1%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.9%
4	他の急性上気道感染症		4.1%
5	急性気管支及び細気管支炎		3.7%
6	アレルギー性鼻炎		3.6%
7	喘息		3.5%
8	皮膚炎及びひび割れ		2.8%
9	腎不全		2.3%
10	他の消化器系の疾患		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	22.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 岐阜県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	岐阜県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.5%	16.2%	3.3%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	29.2%	39.9%	10.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	41.7%	46.8%	33.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.9%	31.8%	10.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	12.0%	15.0%	6.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.6%	51.4%	14.0%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	23.2%	27.3%	16.1%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.0%	28.9%	9.9%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.6%	8.2%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 静岡県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

静岡県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.2%
2	良性新生物		5.2%
3	他の消化器系の疾患		4.9%
4	虚血性心疾患	○	4.0%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.4%
6	他の心疾患	○	3.0%
7	骨折		2.9%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	胃の悪性新生物	○	2.6%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

静岡県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.1%
2	糖尿病	○	5.8%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.4%
4	喘息		3.9%
5	アレルギー性鼻炎		3.8%
6	他の急性上気道感染症		3.5%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	屈折及び調節の障害		2.3%
9	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
10	他の消化器系の疾患		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.3%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


## 静岡県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	静岡県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタリックシンドロームのリスク保有率	11.0%	15.7%	2.6%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	30.4%	41.6%	10.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.3%	41.4%	27.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.5%	31.5%	9.0%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.9%	17.6%	7.3%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.7%	47.6%	17.1%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	23.9%	28.5%	15.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.6%	28.8%	8.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.3%	7.7%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 愛知県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

愛知県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.5%
2	他の消化器系の疾患		5.1%
3	虚血性心疾患	○	5.1%
4	良性新生物		4.4%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.4%
6	他の心疾患	○	3.4%
7	肺の悪性新生物	○	2.5%
8	統合失調症及び妄想性障害		2.5%
9	骨折		2.4%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	18.4%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

愛知県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.7%
2	糖尿病	○	6.0%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.4%
4	喘息		3.8%
5	アレルギー性鼻炎		3.6%
6	他の急性上気道感染症		3.5%
7	皮膚炎及びびん瘡		3.1%
8	急性気管支及びびん細気管支炎		3.1%
9	屈折及び調節の障害		2.2%
10	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん瘡		2.9%
8	急性気管支及びびん細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 愛知県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	愛知県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.7%	14.9%	2.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.1%	43.6%	11.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	34.8%	38.1%	25.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.4%	31.3%	9.0%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.4%	17.1%	6.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	38.9%	46.6%	17.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.6%	28.9%	16.5%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.9%	28.1%	8.4%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	7.0%	9.0%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

# 三重県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

三重県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.0%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.3%
4	虚血性心疾患	○	3.9%
5	他の心疾患	○	3.7%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.9%
7	肺の悪性新生物	○	2.7%
8	骨折		2.5%
9	他の呼吸器系の疾患		2.5%
10	統合失調症及び妄想性障害		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	18.3%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

三重県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.4%
2	糖尿病	○	6.1%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	5.2%
4	アレルギー性鼻炎		3.6%
5	他の急性上気道感染症		3.5%
6	喘息		3.2%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.5%
8	屈折及び調節の障害		2.1%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	他の損傷及び他の外因の影響		1.9%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.7%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

## 三重県(平成20年度)


健診データについての全国値との比較

健診の指標	三重県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.8%	15.0%	2.7%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.3%	44.3%	12.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	33.0%	37.1%	25.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.7%	31.2%	9.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.4%	17.9%	7.5%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	35.7%	47.7%	13.7%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	24.5%	28.8%	16.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.3%	27.9%	8.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.5%	9.2%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%


データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ

年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

# 滋賀県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

滋賀県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.8%
2	虚血性心疾患	○	5.5%
3	他の消化器系の疾患		5.1%
4	良性新生物		4.5%
5	他の心疾患	○	3.2%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.1%
7	他の損傷及び他の外因の影響		3.0%
8	糖尿病	○	2.7%
9	骨折		2.5%
10	肺の悪性新生物	○	2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.4%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

滋賀県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.0%
2	糖尿病	○	6.0%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.3%
4	他の急性上気道感染症		3.9%
5	喘息		3.4%
6	腎不全		3.2%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	アレルギー性鼻炎		2.3%
9	他の消化器系の疾患		2.2%
10	胃及び十二指腸潰瘍		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 21.4%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


## 滋賀県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	滋賀県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタリックシンドロームのリスク保有率	10.1%	14.7%	2.5%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	31.1%	43.0%	11.0%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.5%	41.7%	27.7%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	21.2%	29.0%	8.2%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	11.2%	14.5%	5.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	35.4%	48.7%	12.8%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	24.1%	28.6%	16.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	19.3%	26.3%	7.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.2%	7.5%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 京都府(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

京都府			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.6%
2	他の消化器系の疾患		5.1%
3	虚血性心疾患	○	4.9%
4	良性新生物		4.8%
5	肺の悪性新生物	○	3.3%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
7	他の心疾患	○	3.2%
8	骨折		2.9%
9	胃の悪性新生物	○	2.7%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.7%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

京都府			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.3%
2	糖尿病	○	5.1%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.4%
4	他の急性上気道感染症		3.9%
5	喘息		3.3%
6	皮膚炎及び湿疹		3.3%
7	アレルギー性鼻炎		3.1%
8	他の消化器系の疾患		2.3%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.2%
10	屈折及び調節の障害		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	18.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合

# 京都府(平成20年度)

健診データについての全国値との比較



健診の指標
メタボリックシンドロームのリスク保有率
腹囲のリスク保有率
血圧のリスク保有率
脂質のリスク保有率
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率
喫煙者の割合
BMIのリスク保有率(参考)
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)

	京都府		
	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.2%	14.1%	2.1%
腹囲のリスク保有率	31.9%	42.1%	10.0%
血圧のリスク保有率	35.7%	41.0%	24.1%
脂質のリスク保有率	23.4%	30.3%	8.6%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	11.8%	14.5%	5.9%
喫煙者の割合	38.0%	46.4%	20.1%
BMIのリスク保有率(参考)	23.4%	27.1%	15.4%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.5%	27.7%	8.2%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.6%	7.7%	1.0%



	全国		
	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 大阪府(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

大阪府			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.7%
2	他の消化器系の疾患		5.1%
3	虚血性心疾患	○	4.9%
4	良性新生物		4.3%
5	他の心疾患	○	3.7%
6	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
7	骨折		2.7%
8	肺の悪性新生物	○	2.5%
9	胃の悪性新生物	○	2.3%
10	統合失調症及び妄想性障害		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			21.1%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

大阪府			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.1%
2	糖尿病	○	5.5%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.6%
4	他の急性上気道感染症		4.1%
5	喘息		3.9%
6	皮膚炎及び湿疹		3.2%
7	アレルギー性鼻炎		2.8%
8	胃及び十二指腸炎		2.1%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.1%
10	他の消化器系の疾患		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.1%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月  
 注:医療費には入院外レセプトに含まれる調剤レセプト分を含む。  
 注:割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 大阪府(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	大阪府			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.5%	15.1%	2.2%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.6%	44.2%	9.3%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	33.9%	38.5%	21.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.3%	31.8%	8.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.7%	16.7%	6.0%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.5%	46.6%	20.7%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.9%	30.1%	14.9%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.4%	29.4%	7.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.8%	7.6%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 兵庫県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

兵庫県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.6%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.6%
4	虚血性心疾患	○	4.4%
5	他の心疾患	○	3.4%
6	統合失調症及びび妄想性障害		3.1%
7	肺の悪性新生物	○	3.0%
8	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.0%
9	骨折		2.8%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.7%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 18.3%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

兵庫県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.2%
2	糖尿病	○	5.8%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.6%
4	喘息		3.9%
5	他の急性上気道感染症		3.4%
6	皮膚炎及びび癬疹		3.1%
7	アレルギー性鼻炎		2.7%
8	屈折及び調節の障害		2.5%
9	他の消化器系の疾患		2.2%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びび癬疹		2.9%
8	急性気管支及びび細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 兵庫県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	兵庫県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.0%	16.6%	2.7%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.3%	45.5%	11.1%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	39.1%	44.7%	27.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.1%	31.4%	9.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.1%	17.5%	7.1%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	42.5%	52.9%	20.9%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.6%	29.9%	16.7%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.3%	29.0%	8.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.5%	7.6%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 奈良県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

奈良県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.5%
2	虚血性心疾患	○	5.2%
3	良性新生物		4.6%
4	他の消化器系の疾患		4.5%
5	他の心疾患	○	3.2%
6	骨折		3.1%
7	胃の悪性新生物	○	2.9%
8	妊娠及び胎児発育に関連する障害		2.6%
9	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.6%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.6%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.7%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

奈良県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.9%
2	糖尿病	○	6.2%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.6%
4	他の急性上気道感染症		3.9%
5	喘息		3.1%
6	皮膚炎及びびん疹		2.8%
7	アレルギー性鼻炎		2.7%
8	屈折及び調節の障害		2.4%
9	腎不全		2.2%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.6%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに含まれる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 奈良県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	奈良県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.2%	16.7%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	36.2%	47.6%	12.8%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.9%	41.9%	26.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.8%	30.8%	9.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	11.3%	14.4%	5.0%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	40.9%	52.2%	17.9%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.8%	30.0%	17.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.1%	28.6%	8.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.2%	7.2%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値


注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 和歌山県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

和歌山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.7%
2	良性新生物		5.7%
3	他の消化器系の疾患		5.0%
4	虚血性心疾患	○	4.9%
5	肺の悪性新生物	○	3.0%
6	骨折		2.7%
7	他の心疾患	○	2.7%
8	糖尿病	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.6%
10	脳梗塞	○	2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			225%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			175%

### 入院外の医療費の上位10疾病

和歌山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.7%
2	糖尿病	○	5.3%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.2%
4	胃及び十二指腸炎		3.2%
5	喘息		3.2%
6	他の急性上気道感染症		3.1%
7	アレルギー性鼻炎		2.7%
8	他の消化器系の疾患		2.4%
9	皮膚炎及びびん疹		2.3%
10	腎不全		2.2%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			202%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			209%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 和歌山県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	和歌山県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタリックシンドロームのリスク保有率	12.0%	17.0%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	32.4%	44.1%	10.6%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	41.8%	47.4%	31.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.5%	33.6%	10.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.4%	17.1%	6.6%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.6%	47.8%	18.7%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.6%	30.3%	16.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	24.0%	31.5%	10.1%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.8%	6.8%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 鳥取県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一検複診、付加複診)データ  
年次: 平成20年度

### 入院の医療費の上位10疾病

鳥取県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.5%
2	良性新生物		4.1%
3	他の消化器系の疾患		3.9%
4	虚血性心疾患	○	3.6%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.1%
6	他の損傷及び他の外因の影響		3.0%
7	他の神経系の疾患		2.9%
8	骨折		2.7%
9	肺の悪性新生物	○	2.5%
10	脳内出血	○	2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			15.9%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産後		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

鳥取県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.4%
2	糖尿病	○	5.3%
3	喘息		5.2%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	急性気管支及び細気管支炎		3.0%
6	他の急性上気道感染症		2.8%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.8%
8	腎不全		2.4%
9	急性眼瞼及び扁桃炎		2.3%
10	気分[感情]障害(躁うつ病を含む)		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			18.9%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 鳥取県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	鳥取県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.9%	16.0%	2.9%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	30.2%	42.2%	11.2%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.6%	44.8%	28.9%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	21.3%	29.4%	8.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.7%	18.0%	6.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	49.5%	64.8%	17.8%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	22.8%	26.2%	17.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	19.7%	27.3%	7.9%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.3%	6.2%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 島根県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一検複診、付加複診)データ  
年次: 平成20年度

### 入院の医療費の上位10疾病

島根県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	5.4%
2	他の妊娠、分娩及び産じょく		4.2%
3	他の神経系の疾患		4.0%
4	他の消化器系の疾患		4.0%
5	良性新生物		4.0%
6	他の損傷及び他の外因の影響		3.6%
7	統合失調症及び妄想性障害		3.0%
8	虚血性心疾患	○	2.7%
9	骨折		2.7%
10	脳梗塞	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 10.6%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 17.5%

### 入院外の医療費の上位10疾病

島根県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.4%
2	糖尿病	○	5.5%
3	喘息		4.4%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.3%
5	他の急性上気道感染症		3.3%
6	急性気管支及び細気管支炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.8%
8	アレルギー性鼻炎		2.7%
9	腎不全		2.2%
10	急性咽頭及び扁桃炎		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.2%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 島根県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	島根県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.4%	16.0%	3.2%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.8%	44.3%	14.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	34.8%	40.5%	25.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	20.3%	27.7%	7.7%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.9%	19.0%	7.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.1%	52.9%	10.1%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	22.5%	25.8%	16.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	18.8%	25.5%	7.2%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.1%	5.9%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 岡山県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

岡山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.6%
2	他の消化器系の疾患		5.2%
3	虚血性心疾患	○	4.4%
4	良性新生物		4.0%
5	骨折		3.3%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.0%
8	肺の悪性新生物	○	2.8%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.6%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

岡山県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.8%
2	糖尿病	○	5.6%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	5.0%
4	喘息		4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.3%
6	皮膚炎及びびび		2.9%
7	アレルギー性鼻炎		2.7%
8	腎不全		2.3%
9	他の消化器系の疾患		2.2%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.4%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびび		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 岡山県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	岡山県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.9%	15.9%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.5%	45.8%	12.6%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	34.5%	40.2%	25.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.1%	32.9%	9.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.9%	20.4%	8.3%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	33.6%	46.1%	12.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	24.6%	28.5%	17.9%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.8%	29.5%	8.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.3%	9.3%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 広島県(平成20年度)


### 医療費に関するレーダーチャート



### 健診データに関するレーダーチャート(男性)



### 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

広島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.3%
2	良性新生物		4.7%
3	他の消化器系の疾患		4.7%
4	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.4%
5	虚血性心疾患	○	3.4%
6	肺の悪性新生物	○	3.2%
7	骨折		2.9%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
9	他の神経系の疾患		2.7%
10	統合失調症及び妄想性障害		2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	13.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

広島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.5%
2	糖尿病	○	5.9%
3	喘息		4.6%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.5%
5	皮膚炎及び湿疹		3.3%
6	他の急性上気道感染症		3.1%
7	アレルギー性鼻炎		3.1%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.6%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.1%
10	他の眼及び付属器の疾患		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 広島県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	広島県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.2%	15.3%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.3%	44.6%	12.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.5%	41.0%	27.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.6%	30.9%	8.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.2%	19.9%	8.3%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.2%	46.8%	13.9%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.8%	29.5%	18.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.6%	28.1%	7.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.8%	8.0%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 山口県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

山口県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.7%
2	他の消化器系の疾患		4.9%
3	良性新生物		4.1%
4	統合失調症及び妄想性障害		3.5%
5	骨折		3.5%
6	虚血性心疾患	○	3.3%
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.7%
8	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.6%
9	肺の悪性新生物	○	2.6%
10	脳梗塞	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 15.0%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

山口県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.7%
2	糖尿病	○	5.7%
3	喘息		4.6%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		2.8%
6	アレルギー性鼻炎		2.7%
7	皮膚炎及びびん疹		2.5%
8	腎不全		2.3%
9	胃及び十二指腸炎		2.1%
10	他の消化器系の疾患		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.5%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合: 20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 山口県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	山口県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.6%	16.3%	3.2%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	31.3%	41.9%	12.2%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	39.9%	44.7%	31.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.6%	30.1%	9.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.6%	21.0%	8.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.3%	48.8%	13.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	23.3%	27.0%	16.7%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.3%	28.1%	9.0%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	4.1%	5.8%	0.9%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 徳島県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

徳島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.5%
2	虚血性心疾患	○	6.2%
3	他の消化器系の疾患		4.3%
4	良性新生物		4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.8%
6	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%
7	肺の悪性新生物	○	2.4%
8	他の神経系の疾患		2.4%
9	骨折		2.3%
10	他の心疾患	○	2.2%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	17.2%
-----------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-----------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

徳島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.6%
2	糖尿病	○	6.3%
3	喘息		3.6%
4	他の急性上気道感染症		3.5%
5	腎不全		3.4%
6	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.1%
7	骨折及び調節の障害		2.7%
8	皮膚炎及び湿疹		2.6%
9	アレルギー性鼻炎		2.6%
10	他の消化器系の疾患		2.1%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	21.1%
-----------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支炎及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち 生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-----------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注:割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


## 徳島県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	徳島県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	11.8%	17.0%	3.2%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.5%	46.6%	12.2%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.4%	42.4%	29.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.2%	33.2%	9.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.5%	17.7%	6.7%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	33.6%	45.8%	13.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.2%	33.1%	20.2%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.7%	29.6%	8.7%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.6%	9.7%	1.6%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 香川県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

香川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.6%
2	良性新生物		4.2%
3	他の消化器系の疾患		4.2%
4	骨折		3.5%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.4%
6	虚血性心疾患	○	3.2%
7	他の損傷及び他の外因の影響		3.1%
8	他の心疾患	○	2.8%
9	胃の悪性新生物	○	2.5%
10	他の神経系の疾患		2.3%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			16.1%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

香川県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.3%
2	糖尿病	○	6.1%
3	他の急性上気道感染症		3.8%
4	喘息		3.7%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.6%
6	腎不全		3.1%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.8%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%
9	アレルギー性鼻炎		2.2%
10	他の消化器系の疾患		2.2%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.0%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 香川県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	香川県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.3%	17.3%	3.1%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.1%	46.0%	11.6%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	34.8%	39.7%	25.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.2%	33.2%	10.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.3%	17.9%	7.7%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.0%	48.5%	12.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.9%	31.2%	18.9%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.2%	30.4%	9.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.6%	7.9%	1.2%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 愛媛県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

愛媛県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.1%
2	良性新生物		5.1%
3	他の消化器系の疾患		4.3%
4	虚血性心疾患	○	3.3%
5	他の損傷及び他の外因の影響		3.1%
6	妊娠及び胎児発育に関連する障害		2.9%
7	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.8%
8	糖尿病	○	2.7%
9	骨折		2.6%
10	胃の悪性新生物	○	2.5%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			14.6%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			17.5%

入院外の医療費の上位10疾病

愛媛県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	9.5%
2	糖尿病	○	5.8%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.9%
4	喘息		3.7%
5	他の急性上気道感染症		3.4%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.7%
8	腎不全		2.4%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%
10	急性咽喉頭及び扁桃炎		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			19.2%

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%
上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合			20.9%

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 愛媛県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	愛媛県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	13.4%	18.3%	3.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.0%	45.9%	13.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	40.1%	44.8%	30.7%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.5%	33.4%	9.7%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.2%	20.0%	8.7%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	36.8%	48.3%	14.3%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.4%	32.7%	19.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.4%	30.6%	9.0%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.8%	8.1%	1.3%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 高知県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

高知県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.0%
2	他の消化器系の疾患		4.1%
3	良性新生物		3.7%
4	骨折		3.4%
5	虚血性心疾患	○	3.4%
6	他の損傷及び他の外因の影響		3.3%
7	他の心疾患	○	3.1%
8	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.9%
9	脳梗塞	○	2.7%
10	他の神経系の疾患		2.7%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	163%
-------------------------	------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	175%
-------------------------	------

### 入院外の医療費の上位10疾病

高知県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.6%
3	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
4	他の急性上気道感染症		3.6%
5	アレルギー性鼻炎		3.2%
6	喘息		3.2%
7	腎不全		3.1%
8	皮膚炎及びびん疹		2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.0%
10	屈折及び調節の障害		1.9%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	206%
-------------------------	------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及びびん管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	209%
-------------------------	------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月～平成21年3月  
 注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
 注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 高知県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	高知県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.3%	17.7%	3.7%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	33.4%	45.2%	14.6%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.1%	44.1%	28.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	23.6%	32.7%	9.2%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.5%	21.3%	8.9%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.5%	49.7%	18.1%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.3%	30.9%	19.1%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.4%	29.6%	8.4%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.5%	8.1%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注: 医療費には入院外レセプトに適合できる調剤レセプト分を含む

# 福岡県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

福岡県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.1%
2	他の消化器系の疾患		4.7%
3	良性新生物		4.2%
4	虚血性心疾患	○	3.9%
5	骨折		3.4%
6	肺の悪性新生物	○	2.9%
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
8	統合失調症及び妄想性障害		2.7%
9	他の心疾患	○	2.7%
10	脳梗塞	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

福岡県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.4%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.9%
4	他の急性上気道感染症		3.8%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.5%
6	皮膚炎及びひびき		3.0%
7	アレルギー性鼻炎		2.9%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%
9	他の消化器系の疾患		2.3%
10	他の皮膚及び皮下組織の疾患		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.6%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひびき		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 福岡県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	福岡県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.9%	17.9%	3.4%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.0%	45.0%	12.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.4%	42.6%	27.2%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.1%	33.3%	9.4%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.6%	19.7%	7.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	41.2%	52.4%	19.6%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.6%	30.0%	17.1%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.4%	30.9%	8.9%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.4%	7.7%	1.0%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 佐賀県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

佐賀県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	8.0%
2	他の消化器系の疾患		5.2%
3	良性新生物		4.6%
4	統合失調症及び妄想性障害		4.2%
5	骨折		3.3%
6	虚血性心疾患	○	3.1%
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.9%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の神経系の疾患		2.6%
10	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	13.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

佐賀県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.8%
2	糖尿病	○	5.3%
3	他の急性上気道感染症		3.9%
4	喘息		3.7%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.6%
6	アレルギー性鼻炎		3.3%
7	皮膚炎及びび癬疹		3.1%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.5%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%
10	他の消化器系の疾患		2.3%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びび癬疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 佐賀県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	佐賀県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	9.7%	14.2%	2.8%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	30.8%	42.8%	11.9%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	33.6%	38.7%	25.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.2%	31.1%	8.3%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	13.7%	17.6%	7.7%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	39.3%	55.2%	14.5%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	24.5%	28.8%	17.9%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	20.0%	28.0%	7.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.7%	8.5%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 長崎県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

長崎県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.9%
2	他の消化器系の疾患		4.9%
3	骨折		3.8%
4	良性新生物		3.8%
5	虚血性心疾患	○	3.7%
6	肺の悪性新生物	○	3.4%
7	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
8	他の神経系の疾患		2.6%
9	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.5%
10	胃の悪性新生物	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.4%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

長崎県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	12.1%
2	糖尿病	○	5.2%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.5%
5	他の急性上気道感染症		3.2%
6	皮膚炎及び湿疹		3.0%
7	腎不全		2.7%
8	アレルギー性鼻炎		2.4%
9	他の消化器系の疾患		2.3%
10	急性気管支及び細気管支炎		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及び湿疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次:平成20年7月～平成21年3月  
注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注:割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 長崎県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	長崎県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.8%	15.8%	2.6%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	31.0%	42.7%	11.7%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.8%	43.6%	28.3%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	22.1%	30.6%	8.1%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.5%	18.9%	7.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.8%	51.9%	14.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	25.9%	30.2%	18.8%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	20.3%	28.0%	7.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.1%	7.5%	1.1%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)




性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値  
 注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 熊本県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

熊本県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	6.7%
2	他の消化器系の疾患		5.0%
3	虚血性心疾患	○	4.7%
4	骨折		4.2%
5	良性新生物		3.9%
6	他の損傷及び他の外因の影響		3.5%
7	他の心疾患	○	3.5%
8	他の神経系の疾患		2.9%
9	他の妊娠、分娩及び産じょく		2.5%
10	肺の悪性新生物	○	2.3%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

熊本県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.2%
2	糖尿病	○	5.4%
3	他の急性上気道感染症		4.4%
4	喘息		4.2%
5	アレルギー性鼻炎		3.9%
6	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.3%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.7%
8	腎不全		2.6%
9	他の消化器系の疾患		2.3%
10	胃及び十二指腸炎		2.3%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひび割れ		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合


# 熊本県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	熊本県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	13.0%	19.0%	3.4%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	34.2%	47.2%	13.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.1%	43.5%	27.0%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.0%	34.7%	9.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	15.7%	21.0%	7.4%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	37.5%	52.0%	14.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	27.3%	32.5%	19.0%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.9%	31.8%	8.8%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.9%	8.7%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値


注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 大分県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一検複診、付加複診)データ  
年次: 平成20年度

入院の医療費の上位10疾病

大分県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.7%
2	他の消化器系の疾患		5.8%
3	虚血性心疾患	○	4.6%
4	良性新生物		4.0%
5	他の損傷及び他の外因の影響		2.8%
6	他の神経系の疾患		2.8%
7	他の心疾患	○	2.6%
8	肺の悪性新生物	○	2.6%
9	骨折		2.5%
10	脳梗塞	○	2.5%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

大分県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.7%
2	糖尿病	○	6.4%
3	喘息		4.5%
4	他の急性上気道感染症		4.1%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.7%
6	腎不全		3.4%
7	アレルギー性鼻炎		2.8%
8	他の消化器系の疾患		2.3%
9	皮膚炎及びびび		2.3%
10	急性気管支及び細気管支炎		1.9%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびび		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 大分県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	大分県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.2%	17.0%	3.2%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	36.1%	47.5%	14.5%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.0%	41.4%	25.5%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	24.4%	32.5%	9.0%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	16.0%	20.3%	7.8%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	38.0%	50.6%	14.2%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.1%	32.5%	19.7%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	21.8%	28.9%	8.3%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	6.5%	9.3%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
 年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値


注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 宮崎県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

宮崎県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.1%
2	虚血性心疾患	○	5.5%
3	他の消化器系の疾患		4.7%
4	良性新生物		4.2%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.8%
6	他の心疾患	○	3.4%
7	他の損傷及び他の外因の影響		3.2%
8	妊娠及び胎児発育に関連する障害		2.8%
9	骨折		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	15.9%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

宮崎県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	12.3%
2	喘息		5.5%
3	糖尿病	○	4.7%
4	他の急性上気道感染症		3.5%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.0%
6	皮膚炎及びひびき		2.8%
7	アレルギー性鼻炎		2.6%
8	他の損傷及び他の外因の影響		2.2%
9	屈折及び調節の障害		2.1%
10	他の消化器系の疾患		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.0%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びひびき		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値  
年次: 平成20年7月～平成21年3月  
注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプトを含む。  
注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 宮崎県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	宮崎県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	10.5%	15.4%	2.6%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	30.8%	42.1%	12.6%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	37.1%	42.8%	27.8%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.2%	34.9%	9.6%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.6%	19.2%	7.2%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	38.3%	52.5%	15.4%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	26.9%	31.5%	19.5%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	23.1%	31.9%	8.9%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	5.8%	8.5%	1.4%	5.9%	8.2%	1.2%

データ: 協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次: 平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月~平成21年3月の平均値


注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 鹿児島県(平成20年度)


医療費に関するレーダーチャート



健診データに関するレーダーチャート(男性)



健診データに関するレーダーチャート(女性)



入院の医療費の上位10疾病

鹿児島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.0%
2	他の消化器系の疾患		5.4%
3	虚血性心疾患	○	4.7%
4	良性新生物		3.9%
5	他の神経系の疾患		3.4%
6	他の心疾患	○	2.9%
7	骨折		2.8%
8	白血病	○	2.6%
9	肺の悪性新生物	○	2.5%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	19.8%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

入院外の医療費の上位10疾病

鹿児島県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.4%
4	他の急性上気道感染症		3.9%
5	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	3.0%
6	腎不全		2.8%
7	皮膚炎及びびん疹		2.7%
8	アレルギー性鼻炎		2.6%
9	急性気管支及び細気管支炎		2.3%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.2%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.7%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

注: 割合は傷病名が不祥のレセプトを除いた構成割合

## 鹿児島県(平成20年度)


健診データについての全国値との比較

健診の指標	鹿児島県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	12.7%	17.5%	3.0%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	35.7%	46.5%	13.4%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	38.2%	43.1%	28.4%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	25.8%	33.6%	9.5%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	17.4%	21.7%	8.4%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	43.7%	57.6%	14.3%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	28.5%	32.4%	20.4%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	22.9%	29.8%	8.5%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	7.4%	10.1%	1.9%	5.9%	8.2%	1.2%


データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ

年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)




データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値


注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

# 沖縄県(平成20年度)


## 医療費に関するレーダーチャート



## 健診データに関するレーダーチャート(男性)



## 健診データに関するレーダーチャート(女性)



### 入院の医療費の上位10疾病

沖縄県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の妊娠、分娩及び産じょく		6.1%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	他の悪性新生物	○	4.8%
4	虚血性心疾患	○	3.5%
5	骨折		3.4%
6	良性新生物		3.4%
7	脳内出血	○	3.2%
8	他の神経系の疾患		3.1%
9	他の心疾患	○	2.9%
10	肺炎		2.8%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	14.3%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	他の悪性新生物	○	7.4%
2	他の消化器系の疾患		4.8%
3	良性新生物		4.4%
4	虚血性心疾患	○	4.3%
5	他の妊娠、分娩及び産じょく		3.2%
6	他の心疾患	○	3.1%
7	骨折		2.8%
8	肺の悪性新生物	○	2.7%
9	他の損傷及び他の外因の影響		2.5%
10	他の神経系の疾患		2.4%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	17.5%
-------------------------	-------

### 入院外の医療費の上位10疾病

沖縄県			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	11.6%
2	糖尿病	○	5.6%
3	他の急性上気道感染症		5.0%
4	喘息		5.0%
5	腎不全		4.3%
6	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.0%
7	他の眼及び付属器の疾患		2.3%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	皮膚炎及びびん登疹		2.1%
10	他の損傷及び他の外因の影響		2.0%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	21.1%
-------------------------	-------

全国			
順位	傷病名	生活習慣病	割合
1	高血圧性疾患	○	10.9%
2	糖尿病	○	5.8%
3	喘息		4.3%
4	他の内分泌、栄養及び代謝疾患	○	4.1%
5	他の急性上気道感染症		3.6%
6	アレルギー性鼻炎		2.9%
7	皮膚炎及びびん登疹		2.9%
8	急性気管支及び細気管支炎		2.2%
9	他の消化器系の疾患		2.1%
10	腎不全		2.1%

上位10疾病のうち生活習慣病のしめる点数の割合	20.9%
-------------------------	-------

データ: レセプト基本情報データを使用した集計値

年次: 平成20年7月～平成21年3月

注: 医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む。

注: 割合は傷病名が不詳のレセプトを除いた構成割合


# 沖縄県(平成20年度)

健診データについての全国値との比較


健診の指標	沖縄県			全国		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
メタボリックシンドロームのリスク保有率	14.7%	21.8%	3.4%	11.9%	16.5%	2.8%
腹囲のリスク保有率	40.7%	56.0%	16.1%	34.0%	45.2%	11.9%
血圧のリスク保有率	36.5%	43.2%	25.6%	37.1%	42.3%	26.8%
脂質のリスク保有率	29.1%	40.0%	11.6%	24.5%	32.3%	9.0%
代謝(空腹時血糖)のリスク保有率	14.0%	18.8%	6.4%	14.4%	18.1%	7.0%
喫煙者の割合	33.9%	45.6%	15.0%	39.2%	49.9%	18.0%
BMIのリスク保有率(参考)	36.7%	44.0%	24.9%	26.2%	30.6%	17.6%
脂質(中性脂肪)のリスク保有率(参考)	26.7%	36.7%	10.6%	22.4%	29.5%	8.4%
脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率(参考)	7.2%	10.4%	1.9%	5.9%	8.2%	1.2%

データ:協会けんぽ生活習慣病予防検診(一般健診、付加健診)データ  
 年次:平成20年度

性・年齢別の入院の1人当たり医療費 (1ヶ月)



性・年齢別の入院外の1人当たり医療費 (1ヶ月)



データ:レセプト基本情報データを使用した集計値

年次:平成20年7月~平成21年3月の平均値

注:医療費には入院外レセプトに突合できる調剤レセプト分を含む

[参考]

医療費データについて

- ・レーダーチャートの医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績(平成20年4月～平成21年3月)である。
- ・傷病別と年齢階級別の医療費は平成20年7月～平成21年3月分のレセプトの集計値(1ヶ月平均)であり、年齢階級別平均加入者数は各月末の加入者情報の集計値である。
- ・都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したものの。

健診データについて

- ・各リスク保有率は、平成20年度の協会けんぽ(政府管掌健康保険)における被保険者の生活習慣病予防健診(一般健診、付加健診)の受診者のうち、次の者の占める割合としている。
  - メタボリックシンドロームリスク保有率は、に加え、～のうち2項目以上に該当する者
  - 腹囲のリスク保有率は、男性は85cm以上、女性は90cm以上の者
  - 血圧のリスク保有率は最高血圧が130mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上の者
  - 脂質のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者またはHDLコレステロールが40mg/dl未満の者
  - 代謝(空腹時血糖)のリスク保有率は空腹時血糖が110mg/dl以上の者
  - 喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者
  - BMIのリスク保有率はBMI(肥満度)が25以上の者
  - 脂質(中性脂肪)のリスク保有率は中性脂肪が150mg/dl以上の者
  - 脂質(HDLコレステロール)のリスク保有率はHDLコレステロールが40mg/dl未満の者