

アンケート結果に基づいた
あなたへの

睡眠アドバイス



宮城 みどり

さまへ

朝起きたときに
疲れを感じませんか？



“良い睡眠”とれていますか？

「十分に睡眠時間がとれない」「たくさん寝ても疲れが取れない」などと感じている方は、“良い睡眠”がとれていないかもしれません。睡眠は、最も重要な休養行動です。十分な睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高める工夫を日常生活に取り入れてみませんか。

知っているようで知らない睡眠のこと

～“良い睡眠”へのヒント～

令和5年9月実施のアンケート結果に基づいた、“良い睡眠”へのヒントをご紹介します。ご参考にしていただければ幸いです。

「知っているようで知らない睡眠のこと」【2023年3月版】(厚生労働省)
https://e-kennet.mhlw.go.jp/tools_sleep/をもとに作成



次のページを
ご覧ください。



全国健康保険協会 宮城支部

協会けんぽ

目次 contents



- 日本人の睡眠の状況2 ページ
- 不眠について3 ページ
- 睡眠に影響を与える要因4 ページ
- 睡眠による休養感を高める工夫5~7 ページ
- 眠れないときは8 ページ
- 【まとめ】睡眠による休養感を高める5つのポイント ...9 ページ
- 適切な睡眠に向けた取り組み10 ページ

他の睡眠アドバイスパターンも
こちらからご覧いただけます

<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat070/202411269589654/>




日本人の睡眠の状況



睡眠により休まった感覚（休養感）は適切な睡眠の目安といわれています。国の調査では睡眠による休養が十分とれていない人の割合は2割程度であり、年々増えているようです※1。

睡眠による休養がとれていない人の割合※1



令和5年9月のアンケート調査でも「ご自分の睡眠の質」を“わるい”と回答した方の割合は約37%でした。

必要な睡眠時間は個人差が大きく、年齢によっても変化しますが、6時間以上と考えるのが妥当でしょう。ところが、日本人の睡眠時間は短く、国の調査では約4割の人が6時間未満と回答しています※1。


Sleep Point!

睡眠による休養が足りていない

睡眠時間が確保できない理由として、男性では年代によらず「仕事・勉強・通勤・通学」などで睡眠時間がとれないからが40.2%で最も多くなっています。女性では年代によらず「悩みやストレスなどから」が30.4%で最も多く、若年世代（25～34歳）では「育児のため」が30.5%と最も多くなっています。※2
質の高い十分な睡眠をとることで心身の健康を保つことが重要です。

「知っているようで知らない睡眠のこと解説書」【2023年3月版】（厚生労働省）
https://e-kennet.mhlw.go.jp/tools_sleep/をもとに作成

日本人の睡眠時間※1



令和5年9月に宮城で実施したアンケートでも6時間未満の方は約26%でした。

※1 厚生労働省、平成30年国民健康・栄養調査報告
※2 厚生労働省、平成12年保健福祉動向調査

不眠について



なかなか寝付けない、寝ていても途中で目が覚めてしまうなどの不眠の症状は日本人の15～25%の人が経験する、誰にでも起こりうる症状です。多くは感情的な出来事をきっかけとした心理的なストレスと関連して起こる一時的なものです。しかし、眠れないことを過剰に心配し、眠ろうと頑張りすぎることによって眠りの習慣がかえって不適切となり、不眠の症状が長引く場合もあります。

Sleep Point!

不眠症は国民病!?

一般成人の30～40%が何らかの不眠症状を有しており、女性に多いことが知られています。不眠症状のある方のうち、慢性不眠症は成人の約10%に見られ、その原因はストレス、精神疾患、神経疾患、アルコール、薬剤の副作用など多岐にわたります。

「e-ヘルスネット」(厚生労働省)
<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-001.html>をもとに作成

不眠症状のタイプ

入眠障害

横になってもなかなか寝付けない。悩み事が多いと生じやすい。



中途覚醒

睡眠中に何度も目が覚める。一度目が覚めるとなかなか寝付けない。



早朝覚醒

予定よりも早く目が覚めてしまい、そのあと寝付けない。



休養感の低下

睡眠時間は十分にもかかわらず、睡眠で休まった感覚がない。



不眠の症状が週の半分以上の日に見られ、それにより日中の眠気、集中力の低下、気分の落ち込みなどが生じ、日常生活に支障を伴う状態が続く場合、不眠症の可能性がありま。不眠の背景に、うつ病や不安症といった精神疾患だけでなく、睡眠時無呼吸症候群や身体疾患が隠れている場合もあります。早めに医療機関へ相談することをおすすめします。

Column

ショートスリーパー

適切な睡眠時間には個人差があり、中には6時間未満でも十分に休養がとれる人もいます。レム睡眠、ノンレム睡眠の現れ方に違いがあるとされ、遺伝による影響も考えられています。しかし、多くの人は、短時間睡眠の習慣づけは難しいと言われています*。

レム睡眠：浅い眠りで脳は働いている状態。この間に夢をみることがある。

ノンレム睡眠：深い眠りで脳が休んでいる状態。

睡眠に影響を与える要因




睡眠を妨げる要因は様々です。肥満や女性ホルモンが影響することがあります。

睡眠時無呼吸症候群


睡眠中にいびきや窒息感がある人は、のどが狭くなり息が吸えない状態である「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。特に肥満の方や高齢者は睡眠時無呼吸になりやすく、睡眠時無呼吸があると睡眠で十分な休養が得られにくくなり※、高血圧や糖尿病のリスクが高くなります。

睡眠時無呼吸症候群 (閉塞型)



- ✕ 気道が閉塞
- ✕ 空気の流れが完全に妨げられる

正常な状態



- 気道が開いている
- 空気が肺に入る

空気の通り道が狭くなり、息が吸えない

交感神経が活発化

インスリンが働かない

血圧が上がる

血糖値が上がる

夜間覚醒

夜中に何度も目が覚めてしまう場合、特に高齢者では寢床で過ごす時間が長すぎる可能性があります。その他に、高齢者では夜間頻尿が多く、眠りが浅くなり、目が覚めると尿意を感じたり、その逆に夜中に尿意を感じて目が覚めることがあります。

Sleep Point!

放置すると、とても怖い!!

1時間あたり10秒以上の呼吸停止が20回以上出現するような中等症・重症の睡眠時無呼吸症候群を放置すると、心筋梗塞・脳梗塞・生活習慣病・眠気による事故などを引き起こし、死亡率が非常に高くなるため、すぐに治療が必要です。

「e-ヘルスネット」(厚生労働省)

<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-026.html>をもとに作成

女性ホルモン

女性では月経、妊娠・育児、閉経に関連したホルモンの変動の影響で、睡眠不足や睡眠の質の低下などの睡眠の変化が起こることがあります※。





睡眠による休養感を高める工夫①

Check!

睡眠には、年齢、日中の活動、環境、アルコール、ストレスが影響します。より快適な睡眠ができるよう、それぞれのポイントを確認しましょう。

日中の運動・身体活動を増やす

日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝付きが促され、中途覚醒が減り、睡眠の質が高まります。重要な点は「運動の習慣化」。習慣的に運動している人の70%以上は睡眠の質がよいことがわかっています※。



運動の習慣をつけるためにアプリを使ったり、生活習慣に紐づけて取り組んでみましょう（お風呂に入る前に筋トレ、朝食の前にストレッチなど）。

Sleep Point!

健康増進の観点からも運動習慣の確立を！

良い睡眠の維持・向上のみならず、健康のためにも1日60分程度の身体活動を習慣化することが理想ですが、まずは1日60分未満でも少しずつ運動時間を増やしていきましょう。

「健康づくりのための睡眠ガイド2023」【令和6年9月18日一部修正】（厚生労働省）
<https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf>をもとに作成

働く世代は中・高強度の身体活動、リタイア世代は低強度の身体活動が睡眠不足のリスクを減らします。寝る前2～4時間の運動はかえって目を覚ますので避けましょう。

リタイア世代		働く世代	
低強度		中強度	高強度
● 散歩 ● ストレッチ ● ゴルフ ● 家の掃除 ● 草むしり ● 軽い荷物の運搬	● 体操 ● ヨガ ● 卓球	● 野球 ● ハイキング ● 軽い大工仕事 ● 子どもと活発に遊ぶ ● 雪かき ● 適度な重さの荷物の運搬	● ジョギング ● サイクリング ● 水泳 ● 大工仕事 ● 重い荷物の運搬 ● テニス ● 登山 ● 農作業

睡眠による休養感を高める工夫②



就寝前にリラックスし、嗜好品に注意する

寝る前にリラックスすることは寝付きをよくするために効果的です。
ただし、飲酒や喫煙などの嗜好品は使用する量やタイミングを誤ると、
かえって睡眠を悪化させ、健康を害することがあります※。また、寝る前
についつい別のことをして夜更かしをすることで、睡眠が不足し、休養
感が低下してしまいます。次のことに気をつけましょう。

Sleep Point!

1日のカフェインの摂取量合計は
400mgを超えないように

カフェインは覚醒作用を有するため、
寝付きの悪化や中途覚醒の増加、眠り
の質を低下させる可能性があります。
・カフェイン400mgの目安
…ドリップコーヒーで珈琲カップ4杯分(700cc)

〔健康づくりのための睡眠ガイド2023〕〔令和6年9月18日一部修正〕(厚生労働省)
<https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf>をもとに作成



寝る直前の食事は控える

睡眠直前の2時間以内に食事を摂ると、睡眠の質を低下させる
可能性があります。なるべく決まった時間に食事をするよう心が
けましょう。



夕方以降はカフェインを控える

カフェインには覚醒作用や利尿作用があるため眠りを浅くしたり、
途中でトイレに起きたりする原因にもなります※。
【カフェインを含む飲料】コーヒー、緑茶、紅茶、ココア、栄養ドリンクなど



スマートフォンの使用を控える

睡眠の1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控え、室内
の照明を半分にするなど明るさに気をつけましょう※。寝室にスマホ
などを持ち込まない、通知を切る、寝る直前に返信をしないなどの
習慣化が重要です。



喫煙をしない

タバコに含まれるニコチンは覚醒作用があり、眠りを妨げます。さ
らに、喫煙歴の長い人では睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くな
ることに注意が必要です。睡眠以外の健康のためにも喫煙は控
えましょう。



睡眠による休養感を高める工夫③




寝室の環境を整える

寝るときの環境で重要なことは『光・温度・音』です。
良い睡眠のために、寝室の環境を見直しましょう。

＼ 光 ／

朝日を浴び、日中は明るく、夜は暗い環境を心がけることで体内時計が整います。朝はカーテンを開け、室内に光を取り入れましょう。夜は室内照明を弱くして光の量を減らし、できるだけ暗い環境で眠りましょう。



＼ 温度 ／

室内は快適と感じられる適度な室温を心がけましょう※。冬は毛布や衣服で調整するだけでなく、エアコンなどを活用し、室温を調整しましょう。ただし、乾燥に留意しましょう。寝る前にお風呂に入り一度体温を上げることで、その後に体温が下がりやすくなり、眠りにつきやすくなります。

＼ 音 ／

騒音は眠りを妨げるのでできるだけ静かな環境で眠りましょう。落ち着いた音楽を聴くと寝付きがよくなります。リラックスのために心地よい静かな音楽をかけることもよいでしょう。

照明の調光機能を利用して、朝に寝室を少しずつ明るくすると徐々に眠りが浅くなり、目覚めがよくなります。またアプリやスマートウォッチの機能の中には、眠りが浅いタイミングでアラームをかけて目覚めをサポートするものがあります。利用できるものがあれば積極的に活用してみましょう。

👉 Sleep Point!

寝室の快適な温度と湿度はどのくらい？

睡眠のための適温は20℃前後で、湿度は40～70%くらいに保つのがよいといわれています。

「e-ヘルスネット」(厚生労働省)
<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-001.html>をもとに作成

眠れないときは



感情が高ぶった状態のまま眠ることはできません。感情を沈め眠りに適した状態にするために、就寝前に行く自分に合ったリラックス法を持つことが大切です。こうしたリラックス法を使っても寝付きが悪く20分以上眠れない場合は一度寝床を出て、暗い場所でリラックスをして過ごし、無理に寝ようとせず、眠気を感じたら寝床に戻しましょう。

＼ リラックス法の例 /

- アロマ
- 静かな音楽を聴く
- アイマスク
- 入浴、足湯など



👉 Sleep Point!

良眠のコツは睡眠前に副交感神経を活発に

就寝1～2時間前の入浴は、入浴後の熱放散を促進し、入眠を促す効果が期待できます。ぬるめのお風呂にゆっくり入り、好きな音楽や読書などでリラックスする時間をとって心身の緊張をほぐします。半身浴は心臓への負担も少なく、副交感神経を優位にさせ、睡眠の質を向上させてくれることが分かっています。

〔健康づくりのための睡眠ガイド2023〕【令和6年9月18日一部修正】（厚生労働省）
<https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf>
 [e-ヘルスネット]（厚生労働省）
<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-001.html>
 をもとに作成

Column

寝酒はなぜ悪い？

眠れないときにお酒を飲む方が多いですが、寝酒は不適切な睡眠の習慣として代表的なものです。初めは寝付きが良くなると感じられる場合もありますが、寝酒を続けるうちに慣れが生じ、初めと同じ作用が得られなくなります。寝付いたあとの眠りが浅くなり、目が覚めやすくなってしまいます。またお酒には利尿作用があることからトイレに起きてしまうことが多くなります。温かい飲み物を飲んだり、軽いストレッチをしたりするなど他のリラックス法を使った不眠への対処法を探してみましょう。

Column

新型コロナウイルス感染症の流行による影響

2019年に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、生活習慣が変化しストレスが増えたことで不眠症が増加しました。このような社会構造の大きな変化の中で、適切な睡眠を維持するには、なるべく普段通りの生活習慣を心がけることが重要です。起床時刻を一定にする、毎日同じ時間に食事をする、外出していなくてもお風呂に入り着替える、友人や家族とコミュニケーションをとるなど生活リズムを一定にするよう心がけましょう。また、寝床で読書、パソコン作業など睡眠以外のことをしないようにしましょう。



【まとめ】

睡眠による休養感を高める5つのポイント



Sleep Point!

- ①働く世代は1日6時間以上の睡眠を確保、
リタイア世代は長寝に注意
- ②平日に良い睡眠をとることで、寝だめや
昼寝にできるだけ頼らない習慣づくりを
- ③適度な運動習慣を身につけ、肥満に
注意し、眠りの質を保つ
- ④就寝前の食事、飲酒、喫煙、カフェイン、
スマホは控える
- ⑤光、温度、音に配慮した快適な睡眠環境を





適切な睡眠に向けた取り組み

- 休養感のある睡眠が得られるよう、生活習慣を見直しましょう。
- 生活の中で心がけてみようと思ったことはありますか？
改善目標を立ててみましょう。

改善目標

改善目標の例※

<日中の行動>

- 毎朝決まった時間に起きる
- 朝日の強い光をしっかりと浴びる
- しっかり朝食をとる
- 日中できるだけ日光を浴びるか
明るい部屋で過ごす
- 日中はできるだけ人と接触し
活動的に過ごす
- 趣味などを楽しみ活動的に過ごす
- 昼寝をするときは昼食後から午後3時の
間で15分～30分以内にする
- 夕方に軽い運動や散歩をする
- 夕食以降にコーヒーをなるべく飲まない
- 就寝の2時間前までに食事を終わらせる

<リラクゼーション>

- ぬるめのお風呂にゆっくりつかる
- 寢床で読書、パソコン作業など
睡眠以外のことをしない
- 就寝前に心と体が
リラックスできるように心がける
- 寢床で悩み事をしない

<寝るときの行動・環境>

- 寢床に入る1時間前には
部屋の明かりを少し落とす
- 寝室をできるだけ静かに、適温に保つ
- 眠くなってから寢床に入る
- 夜更かしをしないようにする
- 寝酒(眠る目的での飲酒)をしない



厚生労働省

ぐっすり
「Good Sleepガイド」を参考に
睡眠習慣を整えましょう！

Good Sleepガイド



全国健康保険協会 宮城支部
協会けんぽ

〒980-8561

宮城県仙台市青葉区中央4-4-19 アーバンネット仙台中央ビル14階

TEL: 022-714-6851 FAX: 022-714-6857

<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi>

協会けんぽ 宮城



宮城支部メルマガ
会員募集中！



登録はこちら▲

宮城支部の
LINE公式アカウント



友だち追加はこちら▲