

協会けんぽの都道府県別医療費等のグラフ（平成26年度）

1. 医療費の状況

- 入院（1人当たり医療費、受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）（全国平均との差）
- 外来（1人当たり医療費、受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）（全国平均との差）
- 歯科（1人当たり医療費、受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費）（全国平均との差）



2. 高血圧・高脂血症・糖尿病の医療費（外来）の状況

- 1件当たり医療費、1件当たり日数、1日当たり医療費（全国平均との差）

3. 健診結果の状況


- メタボリックリスク保有率（全国平均との差）
- メタボリックリスク予備群の割合（全国平均との差）
- 腹囲リスク保有率（全国平均との差）
- 血圧リスク保有率（全国平均との差）
- 脂質リスク保有率（全国平均との差）
- 代謝リスク保有率（全国平均との差）
- 喫煙者の割合（全国平均との差）（参考）
- BMIリスク保有率（全国平均との差）（参考）
- 中性脂肪リスク保有率（全国平均との差）（参考）
- HDLコレステロールリスク保有率（全国平均との差）（参考）

1. 協会けんぽの医療費の状況




1件当たり日数(入院)(全国平均との差)

平均:10.1日/件



1日当たり医療費(入院)(全国平均との差)


平均:47,106円/日



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


1人当たり医療費(外来)(全国平均との差)

平均:97,528円/人



受診率(外来)(全国平均との差)


平均:5,986件/千人



北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄


1件当たり日数(外来)(全国平均との差)

平均:1.48日/件



1日当たり医療費(外来)(全国平均との差)


平均:11,040円/日



北海道・東北 関東・甲信越 北陸 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄


1人当たり医療費(歯科)(全国平均との差)

平均:18,221円/人



受診率(歯科)(全国平均との差)


平均:1,485件/千人



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


1件当たり日数(歯科)(全国平均との差)

平均:1.88日/件




1日当たり医療費(歯科)(全国平均との差)

平均:6,532円/日




■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


2. 協会けんぽの高血圧・高脂血症・糖尿病の医療費(外来)の状況



1件当たり日数(高血圧、外来)(全国平均との差)




1日当たり医療費(高血圧、外来(調剤を含む))(全国平均との差)




北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄

1件当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))(全国平均との差)


(円/件)



1件当たり日数(高脂血症、外来)(全国平均との差)




1日当たり医療費(高脂血症、外来(調剤を含む))(全国平均との差)




北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄

1件当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))(全国平均との差)


(円/件)



1件当たり日数(糖尿病、外来)(全国平均との差)



1日当たり医療費(糖尿病、外来(調剤を含む))(全国平均との差)




北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄

3. 協会けんぽの健診結果の状況


メタボリックリスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:19.2%



メタボリックリスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:4.1%



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


メタボリックリスク予備群の割合(男)(全国平均との差)

平均: 17.3%



メタボリックリスク予備群の割合(女)(全国平均との差)


平均: 4.9%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


腹囲リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:45.7%



腹囲リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:12.7%



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


血圧リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:46.9%



血圧リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:29.4%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


脂質リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:35.0%



脂質リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:15.1%



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


代謝リスク保有率(男)(全国平均との差)

平均:17.9%



代謝リスク保有率(女)(全国平均との差)


平均:7.4%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


喫煙者の割合(男)(全国平均との差)(参考)

平均:43.6%



喫煙者の割合(女)(全国平均との差)(参考)


平均:17.0%



北海道・東北
 関東・甲信越
 北陸
 東海
 関西
 中国
 四国
 九州・沖縄


中性脂肪リスク保有率(男)(全国平均との差)(参考)

平均:27.6%



中性脂肪リスク保有率(女)(全国平均との差)(参考)


平均:8.4%



■北海道・東北 □関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄


HDLコレステロールリスク保有率(男)(全国平均との差)(参考)

平均:8.1%



HDLコレステロールリスク保有率(女)(全国平均との差)(参考)

平均:1.2%



■北海道・東北 ■関東・甲信越 □北陸 □東海 □関西 □中国 □四国 □九州・沖縄

[参考]

○医療費のデータについて

- ・ 傷病合計の医療費、平均加入者数は、協会けんぽ月報による実績（平成26年4月～平成27年3月）である。
- ・ 傷病別の医療費は、平成26年4月～平成27年3月のレセプト（入院については電子レセプトのみ、入院外については電子レセプト及び電算機で作成されたレセプト（続紙付レセプトを除く））の集計値であり、入院外レセプトと調剤レセプトを接続させている。
- ・ 都道府県別の医療費は、加入者の事業所所在地の都道府県毎に集計したものである。

○健診データについて

- ・ 集計対象データは平成26年度末に35歳以上75歳以下に達し、1年間継続して協会けんぽに加入した被保険者が平成26年度中に受診した生活習慣病予防健診（一般健診、付加健診）データのうち、特定保健指導レベルが判定不可能でないもの（35～39歳の特定保健指導レベルは40歳以上の階層化の方法に準じて判定）とし、リスク保有者割合等の分母は、特に断りのない場合、当該リスクの判定が可能なデータの総数としている。
- ① メタボリックリスク保有率は、③かつ④～⑥のうち2項目以上に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）
 - ② メタボリックリスク予備群の割合は、③かつ④～⑥のうち1項目に該当する者の割合（分母は集計対象データ総数）
 - ③ 腹囲のリスク保有率は、内臓脂肪面積が100cm²以上の者（ただし内臓脂肪面積の検査値がない場合は、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者）の割合
 - ④ 血圧のリスク保有率は、収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、または高血圧に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑤ 脂質のリスク保有率は、中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、または脂質異常症に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑥ 代謝のリスク保有率は、空腹時血糖110mg/dl以上（ただし空腹時血糖の検査がない場合は、HbA1c 6.0%以上）、または糖尿病に対する薬剤治療ありの者の割合
 - ⑦ 喫煙者の割合は問診票において喫煙者であると回答した者の割合
 - ⑧ BMIのリスク保有率はBMI（肥満度）が25以上の者の割合
 - ⑨ 脂質（中性脂肪）のリスク保有率は中性脂肪150mg/dl以上の者の割合
 - ⑩ 脂質（HDLコレステロール）のリスク保有率はHDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合